

もも・ネクタリン特報



6/6に梅雨入りし、今後は連続した降雨や気温の上昇によって病害虫が多発する時期となります。せん孔細菌病の発生園では、葉病斑が多発し、果実病斑も確認されております。果実感染を防止するため、早期に袋掛けを進めましょう。

もも

他作物へ飛散しないよう十分注意する。ももとネクタリンの混植園ではネクタリン防除を実施する。

散布時期： 6月25日～7月4日 頃（前回散布から15日後）

散布日	月	日
散布量		リットル

散布薬剤：	水	100ℓ		
	展着剤	20ml		
	ダニゲッターフロアブル	50ml	（前日、1回）	・・・ 殺ダニ剤
	ナリアWDG	50g	（前日、2回）	・・・ 殺菌剤
	劇イカズチWDG	66g	（前日、5回）	・・・ 殺虫剤

対象病害虫：ハダニ類、黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類

10a 当り散布量： 600ℓ

ネクタリン

散布時期： 6月21日～30日 頃（前回散布から15日後）

散布日	月	日
散布量		リットル

散布薬剤：	水	100ℓ		
	展着剤	20ml		
	ナリアWDG	50g	（前日、2回）	・・・ 殺菌剤
	劇イカズチWDG	66g	（前日、2回）	・・・ 殺虫剤

対象病害虫：黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、モモハモグリガ、カメムシ類

10a 当り散布量： 600ℓ

【注意事項（もも・ネクタリン共通）】 劇・・・劇物のため、ご購入の際は印鑑をご持参下さい。

- ①せん孔細菌病の発生が心配される場合は、スターナ水和剤の1000倍（7日前、3回）を加用する。＊収穫前規制注意
- ②ナリアWDGはぶどう（ピオーネ、サニールージュ）、西洋梨ル・レクチェに薬害を生じる恐れがあるので、隣接園は飛散しないよう注意する。
- ③ダニゲッターフロアブルは、ぶどうにかかると薬害を生じる恐れがあるので、隣接園は飛散しないよう注意する。