



- ◆ 本年の梅雨入りは遅れる予想がされています（昨年 6/10 平年 6/8）梅雨期後半にまとまった雨が予想されています。
- ◆ 種なしぶどう栽培者にて、ストマイ散布していない方は散布時期が遅れないように散布しましょう。

ぶどうセンター付近 露地巨峰生育状況	発芽期	展葉期	開花期	満開期	落花期
平年	4月28日	5月2日	6月11日	6月14日	6月17日
昨年	5月1日	5月6日	6月9日	6月11日	6月14日
本年	4月29日	5月2日	6月11日頃	6月14日頃	6月17日頃

【第4回ぶどう薬剤散布（有核・種なし共通）】

散布時期	開花3日前（6/7～10頃）	
散布薬剤	水	100ℓ
	展着剤	10mℓ
	スイッチ顆粒水和剤	33g
	オーソサイド水和剤 80	125g
	オルトラン水和剤	66g
	【有核巨峰はマルポロン 100g（花振り防止）】 【種なしぶどうはビックマグ 100g（葉の健全化）】	
散布量	10a 当り 400ℓ 以上 死角のないようたっぷり散布する	
適用病害虫	べと病・灰色かび病・晩腐病・褐斑病・黒とう病 スリップス類・フタテンヒメヨコバイ	
注意点	① オルトラン水和剤は果樹類に登録が少ないため、散布の際は隣接園に飛散しないよう注意する。 ② 種なしぶどう園でストマイ液剤未散布園は 1,000 倍（満開予定日 14 日前～開花始期まで、1 回）を開花までに必ず散布する。ただし、有核巨峰園には絶対に飛散しないように散布する。 ③ 灰色かび病の発生園はゲッター水和剤 1,500 倍（開花直前～落弁期、ただし 45 日前まで 1 回）を散布する。	

有核巨峰の管理について（結実確保に向けて）

・新梢管理

新梢が 30～40cm 程度になったら誘引を実施する。（風による枝のねじれ防止、棚の明るさ確保）また、暗くならない程度に枝を置き樹勢を落ち着け結実確保に努める。

枝の長さについては開花直前の第 2 新梢長が 40～50cm 程度が理想

・フラスターの散布

有核巨峰については、結実確保のため必ず散布する。

ただし、早過ぎる散布は十分な効果が出ない場合があるので、生育を確認し適期に（開花始期まで）散布に努める。

散布方法など詳細については、[前回の特報（No.3）](#)をご覧ください。

・有核巨峰の房きりについて

6 月上旬頃から開始。実施時期により房きりの長さが若干違うので注意必要。

・開花 1 週間前 4cm ・開花始め 5cm ・満開時 6～7cm

※詳しくは講習会にて説明いたします。

・かん水の実施

近年の気象傾向は、開花前に乾燥し開花直前に長雨が降る傾向にあります。開花前に急激な降雨があると樹勢が一気に強くなり結実が不安定になることがありますので、乾燥が続く場合は定期的なかん水を実施し、急激な雨に備えるようにしましょう。あわせて敷きワラの実施をしましょう。

種なし関係の管理は裏面をご覧ください

種なしぶどうの管理について (ストマイ液剤・フラスター液剤・ジベ処理について)

・ストマイ液剤 20 の散布について

種なし品種を栽培している方は必ず散布を実施してください

対象品種：種なし巨峰・ピオーネ・シャインマスカット 等種なしぶどう全品種

登録内容：満開予定日の 14 日前～開花始期

使用濃度：1,000 倍 300ℓ / 10a

注意事項：散布が遅くなると種が入ることがあるので開花前までに必ず散布する。
房に付着しないと効果がないので、房にしっかり付着するよう散布する。
高温時の散布は避ける。

有核ぶどうに絶対に飛散しないよう注意する。

・フラスター液剤の散布について (種なしぶどうへの散布の場合)

新梢伸長抑制、着粒安定のため散布する

使用時期：展葉 11 枚頃 (開花始期まで)

使用倍率：1,000～1,500 倍 (使用濃度等についてはご相談下さい)

・ジベレリン処理について

ジベ処理：(1 回目) 結実確保・無種子化

満開～満開3日後実施。ぶどうの粒の大きさがマッチ棒の頭くらいになった頃実施。

ジベ処理：(2 回目) 果粒肥大促進

前回から 10～15 日後実施。摘粒作業終了後に実施。場合により果粉溶脱の心配あり。

※病害虫予防のため、処理後早めに袋・傘かけを実施する。

品種	1 回目処理時期	1 回目処理濃度	2 回目処理時期	2 回目
種なし巨峰	満開～満開3日	ジベレリン 25ppm + フルメット 5ppm	満開 10～15 日後	ジベ 25ppm
シャインマスカット				
クイーンニーナ				
ベニバロード				
ナガノパープル		ジベレリン 25ppm のみ		
ピオーネ		ジベレリン 12.5ppm + フルメット 5ppm		
サニールーシュ	満開 14～20 日前 (展葉9枚頃)	ジベレリン 25ppm + フルメット 3ppm		
ロザリオピアンコ	—	—	満開 10～20 日後	
1 発処理 (品種共通)	満開3～5日後	ジベレリン 25ppm + フルメット 10ppm		

ジベレリン 12.5ppm…水 2 リットルにジベ 1 粒

ジベレリン 25ppm…水 2 リットルにジベ 2 粒

フルメット 5ppm…水 2 リットルにフルメット 1 本

フルメット 10ppm…水 2 リットルにフルメット 2 本

※粒肥大しすぎる場合はフルメット液剤を調節しましょう

ジベ処理 1 回目終了後、摘粒作業を実施。2 回目のジベ処理までに終了させる。

※その他品種については、各種講習会または園芸技術課ぶどう担当までご相談下さい。