



毎日のお仕事お疲れ様です。生育は、昨年よりも 7 日程早く進んでいます。肥大については昨年より進んでいます、概ね平年並みに推移している状況です。有袋栽培者の方は、早めの袋掛けを行ってください。無袋栽培者の方は、引き続き防除の徹底を行ってください。

## ◆ **和梨**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

### 【有袋】7 月上旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

|       |                                                                                                                 |                    |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| 散布時期  | 7 月 5 日～10 日                                                                                                    | *注意事項①参照           | ◆ 散布日：7 月 日 |
| 散布薬剤  | 水                                                                                                               | 1 0 0 リットル         | ◆ 散布量： リットル |
|       | 展着剤                                                                                                             | 2 0 ml             |             |
|       | アーデントフロアブル                                                                                                      | 5 0 ml（前日、3 回）     |             |
|       | ロブドー水和剤                                                                                                         | 1 2 5 g（14 日前、5 回） |             |
| 対象病害虫 | 黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ハダニ類                                                                                      |                    |             |
| 散 布 量 | 10 a 当り：450 リットル以上                                                                                              |                    |             |
| 注意事項  | ① ロブドー水和剤に代えて、キノンドーフロアブル 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。<br>② 通常展着剤（ハイテンパワー等）に代えて、固着性展着剤アビオン E1,000 倍を使用すると、薬液の付着効果が高まる。 |                    |             |

（参考）和梨有袋 7 月下旬の薬剤散布予定：7/20～25

### 【無袋】7 月上旬の薬剤散布（前回より 10 日後）

|       |                                                                                      |                   |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 散布時期  | 7 月 5 日～10 日                                                                         | *注意事項①参照          | ◆ 散布日：7 月 日 |
| 散布薬剤  | 水                                                                                    | 1 0 0 リットル        | ◆ 散布量： リットル |
|       | 展着剤                                                                                  | 2 0 ml            |             |
|       | ベルクトフロアブル                                                                            | 5 0 ml（14 日前、5 回） |             |
|       | オリオン水和剤 40 (劇)                                                                       | 1 0 0 g（3 日前、2 回） | *注意事項②参照    |
| 対象病害虫 | 黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類                                                       |                   |             |
| 散 布 量 | 10 a 当り：450 リットル以上                                                                   |                   |             |
| 注意事項  | ① 黒斑病対策：ロブラール水和剤 1,500 倍（14 日前、5 回）を加用する。<br>② オリオン水和剤 40 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 |                   |             |

（参考）和梨無袋 7 月下旬の薬剤散布予定：7/20～25

## ◆ 7 月上中旬の重点作業

### ① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）

梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 可樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。

### ② 雑草管理：急激に雑草が伸びてきています。害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底してください。

除草剤使用基準：バスタ液剤（水 100ℓ 当り バスタ液剤 500ml）

西洋梨の薬剤散布は次頁をご覧ください。

# 西洋梨

【有袋】 7月上中旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

◆ 散布日：7月 日

◆ 散布量： リットル

**【無袋】** 7月上旬の防除（前回から10日後）

◆ 散布日：7月 日  
◆ 散布量： ℓ

**【無袋】** 7月中旬の防除（前回から10日後）

|             |   |
|-------------|---|
| ◆ 散布日 : 7 月 | 日 |
| ◆ 散布量 :     | ℓ |

(参考) 西洋梨有袋・無袋共通：7月下旬の薬剤散布予定：7/25～30