



平成30年7月13日
JA中野市営農センター
JA中野市ナシ部会

◆ 和梨の7月下旬の定期防除

散布時期	7 月 20 日～25 日	◆ 散布日：7 月 日	
散布薬剤	水	1 0 0 リットル	◆ 散布量： リットル
	展着剤	2 0 ml	* 注意事項②参照
	スターマイトフロアブル	5 0 ml	(前日、1 回)
	キノドーフロアブル	1 0 0 ml	(3 日前、9 回)
	オリオン水和剤 40(劇)	1 0 0 g	(3 日前、2 回) * 注意事項③、④参照
対象病虫害	黒斑病、輪紋病 ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類		
散 布 量	10 アール当たり：450 リットル以上		
注意事項	① 殺ダニ剤の効果を上げるため、今回の薬剤散布の 3～4 日前に下草除草を実施する。 ② 通常展着剤に代えて、機能性展着剤ササラの 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。(殺ダニ剤との相乗効果も期待できる) ③ オリオン水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ④ アブラムシ・カメムシ対策 ：オリオン水和剤に代えて、バリアード顆粒水和剤(劇)2,000 倍(前日、3 回)を使用する。 バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。		

【無袋】 前回から 15 日後

散布時期	7 月 20 日～25 日		◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水	1 0 0 リットル	◆ 散布量： リットル
	展着剤	2 0 ml	* 注意事項②参照
	スターマイトフロアブル	5 0 ml	(前日、1 回)
	キノンドーフロアブル	1 0 0 ml	(3 日前、9 回)
	バリアード顆粒水和剤(劇)	5 0 g	(前日、3 回)
対象病虫害	黒斑病、輪紋病 ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、アブラムシ類、カメムシ類		
散 布 量	10 アール当たり：450 リットル以上		
注意事項	① 殺ダニ剤の効果を上げるため、今回の薬剤散布の 3～4 日前に下草除草を実施する。 ② 通常展着剤に代えて、機能性展着剤ササラの 2,000 倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。(殺ダニ剤との相乗効果も期待できる) ③ バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。		

(参考) 無袋 8 月上旬の 薬剤散布予定 : 8/5~10 日頃 (前回より 15 日後)

● 西洋梨の定期散布は次頁をご覧ください。

◆ 西洋梨の7月下旬の定期防除

【有袋】 前回から 20 日後

散布時期	7 月 25 日～30 日	◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水 1 0 0 ℓ 当り 展着剤 1 0 mℓ スターマイトフロアブル 5 0 mℓ (前日、1 回) * 注意事項①参照 キノンドーフロアブル 1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) * 注意事項②参照 オリオン水和剤 4 0 (劇) 1 0 0 g (3 日前、2 回) * 注意事項③参照	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類	
散布量	10 アール当り：600 ㍓以上	
注意事項	① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフロアブル 2,000 倍 (前日、1 回) でもよい。 ② キノンドーフロアブルに代えてオキシラン水和剤 500 倍 (3 日前、9 回) でも良い。 <u>有機銅成分を含む薬剤 (オキシラン水和剤やキノンドーフロアブル等) の使用回数は合計で 9 回以内であるので注意する。</u> ③ オリオン水和剤 40 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ④ 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。	

(参考) 8月中旬の 薬剤散布予定：8/15～20日頃（前回より20日後）

【無袋】 前回から 10 日後

散布時期	7 月 25～30 日	◆ 散布日：7 月 日
散布薬剤	水	1 0 0 ℓ 当り
	展着剤	1 0 mℓ
	スターマイトフロアブル	5 0 mℓ (前日、1 回) *注意事項①参照
	キノンドーフロアブル	1 0 0 mℓ (3 日前、9 回) *注意事項②参照
	オリオン水和剤 40(劇)	1 0 0 g (3 日前、2 回) *注意事項③参照
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ	
散布量	10 アール当り：600 ㍲以上	
注意事項	① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフロアブル 2,000 倍(前日、1 回)でもよい。 ② キノンドーフロアブルに代えてオキシラン水和剤 500 倍(3 日前、9 回)でも良い。<u>有機銅成分を含む薬剤(オキシラン水和剤やキノンドーフロアブル等)の使用回数は合計で 9 回以内であるので注意する。</u> ③ オリオン水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ④ 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。	

(参考) 8月上旬の薬剤散布予定：8/10～15日頃（前回より15日後）

◆ 7月下旬の重点管理作業

- ① 土壌水分管理：定期的なかん水の実施と土壌乾燥防止のため、樹冠下に敷きワラやマルチ等を早めに実施する。
- ② 雑草管理：**バスタ液剤 200 倍**を使用する ⇒ 水 100ℓ 当りバスタ液剤 500ml
- ③ 西洋梨腐らん病対策：梅雨期間に感染拡大しています。病斑を見つけ次第、削り取りを実施してください。