


もも・ネクタリン特報

【定期散布】

- ・隣接する園地や収穫中の作物に飛散しないよう十分注意する。
- ・ももとネクタリンの混植園は、ネクタリンの防除を実施する。



もも

散布時期：前回散布から15日後（7月25日～8月3日頃）

*中生種（なつっこ等）で除袋間近な場合は、除袋後に散布を実施する。

| | | |
|------------|------|---------|
| 散布薬剤： 水 | 100% | |
| 展着剤 | 20ml | |
| ベルコートフロアブル | 50ml | （前日、3回） |
| アーデントフロアブル | 50ml | （前日、3回） |

| | | |
|-----|---|------|
| 散布日 | 月 | 日 |
| 散布量 | | リットル |

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、（モモハモグリガ）、アザミウマ類

10a 当り散布量：600%

【注意事項】

- ① ハダニ類が発生している場合は、コロマイト乳剤の1,000倍（7日前、1回）を加用する。

ネクタリン

散布時期：前回散布から15日後（7月21日～30日頃）

| | | |
|------------|------|---------|
| 散布薬剤： 水 | 100% | |
| 展着剤 | 20ml | |
| ベルコートフロアブル | 50ml | （前日、2回） |
| アーデントフロアブル | 50ml | （前日、3回） |

| | | |
|-----|----|------|
| 散布日 | 7月 | 日 |
| 散布量 | | リットル |

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、（モモハモグリガ）

10a 当り散布量：600%

【注意事項】

- ① ハダニ類が発生している場合は、コロマイト乳剤の1,000倍（7日前、1回）を加用する。

次頁には、管理情報、腐敗病防除対策が掲載されております。

熟度優先の収穫を心掛けましょう。

また、成熟は昨年より7日程度早い状況です。除袋・反射マルチ・葉摘み等の管理作業は、早めに進めましょう。

*反射マルチは、白系の「タイベック」等を使用しましょう。（高温対策、着色向上）

1. H30 収穫開始予想 (7/12 現在)

直前の気象条件により前後します。下表を参考に、果実の状況を見て収穫期を判断しましょう。

| 品種名 | 南部地区 | 平岡地区 |
|-----------|-------|-------|
| 白鳳 | 7/26～ | 7/27～ |
| あかつき | 7/27～ | 7/29～ |
| なつっこ | 8/6～ | 8/8～ |
| 晶光(ネクタリン) | 7/30～ | 8/1～ |
| 川中島白桃 | 8/19～ | 8/21～ |
| 黄金桃 | 8/22～ | 8/24～ |

2. 除袋目安

*あくまで目安ですので、園地状況を確認し、試し除袋してから作業に入りましょう。

| 品種 | 除袋 目安 |
|-----------|--------------|
| なつっこ | 収穫8～10日前までに |
| 山根白桃、白桃系 | 収穫12～14日前までに |
| 川中島白桃、黄金桃 | 収穫8～10日前までに |

3. 果実腐敗防止対策 降雨が続く病害が心配される場合は殺菌剤の特別を実施しましょう(下表)

灰星病の耐性菌出現を回避するため、同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

| | 薬剤の系統 | 薬剤名 | 使用濃度 | 適正使用基準 | 使用上の注意事項 |
|-------|-------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---|
| もも | エルゴステロール 生合成阻害剤(DMI) | スコア顆粒水和剤 | 2000倍 | 収穫前日まで(3回) | 1. ベルクートは、バラ・メロンに葉害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると葉害が発生する場合がありますので注意する。 |
| | | オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル | 2000倍 2000倍 | 収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(3回) | |
| ネクタリン | その他 | ロブラール水和剤 | 1500倍 | 収穫前日まで(3回) | 1. ベルクートは、バラ・メロンに葉害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると葉害が発生する場合がありますので注意する。 |
| | | ベルクートフロアブル ダコニール1000 | 2000倍 1000倍 | 収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(6回) | |
| ネクタリン | エルゴステロール 生合成阻害剤(DMI) | スコア顆粒水和剤 | 2000倍 | 収穫前日まで(2回) | 1. ベルクートは、バラ・メロンに葉害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると葉害が発生する場合がありますので注意する。 |
| | | オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル | 2000倍 2000倍 | 収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(3回) | |
| ネクタリン | その他 | ロブラール水和剤 | 1500倍 | 収穫前日まで(3回) | 1. ベルクートは、バラ・メロンに葉害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると葉害が発生する場合がありますので注意する。 |
| | | ベルクートフロアブル ダコニール1000 | 2000倍 1000倍 | 収穫前日まで(2回) 収穫前日まで(2回) | |