



生育は昨年より 7 日程進んでいます。7 月の異常高温によりハダニ類の発生が増加中です。引き続き一定の間隔で薬剤散布を進めてください。果実肥大は少雨により停滞している模様です。ついでには、定期的なかん水を実施してください。盛夏期は特に死角で発生しないように散布量はいつもより多めに設定してください。

◆ 和梨 8 月の定期防除 (他品目への飛散に十分注意してください)

8 月上旬の薬剤散布 (前回より 15 日後)

散布時期	8 月 5 日～10 日	* 幸水等の最終散布	◆ 散布日 : 8 月 日
散布薬剤	水 展着剤 コロマイト乳剤 ベルコートフロアブル エクシレル SE	100ℓ 20ml 100ml (前日、1回) 50ml (14 日前、5回) 20ml (前日、3回)	◆ 散布量 : ℓ
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、 ハダニ類 、シンクイムシ類		
散布量	10 アール当たり : 450 ℓ以上		
注意事項	① 収穫前散布規制のため、早生種の愛甘水等には散布しない。 ② 幸水等はベルコートフロアブルに代えてキノンドーフロアブル 1000 倍 (3 日前、9 回) を使用する。(収穫前規制のため)		

8 月下旬の薬剤散布 (前回より 15 日後)

散布時期	8 月 20 日～25 日	* 豊水等の最終散布	◆ 散布日 : 8 月 日
散布薬剤	水 展着剤 ナリアWDG イカズチWDG (劇)	100ℓ 20ml 50g (前日、3回) 66g (前日、3回)	◆ 散布量 ℓ
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類		
散布量	10 アール当たり : 450 ℓ以上		
注意事項	① ナリアWDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 ② <u>イカズチWDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。</u>		

(参考) 有袋・無袋 9 月上旬の薬剤散布予定 9/5～10 日頃 (前回より 15 日後)

◆ 共通注意事項

- ① 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。
- ② キノンドーフロアブルを使用する際は、容器の口を下に向けて横に回しながら上下に振り、容器内でよく溶かしてから SS 等のタンクへ投入する。

◆ 西洋梨 8月の定期防除 (他品目への飛散に十分注意してください)

🌟 有袋：8月中旬の薬剤散布 (前回より 20 日後)

散布時期	8月 15 日～20 日 *オーロラ等の最終防除	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 1000ℓ 当り 展着剤 10mℓ キノンドーフロアブル 1000mℓ (3日前、9回) イカズチWDG (劇) 66g (前日、3回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ以上	
注意事項	① キノンドーフロアブルに代えてオキシラン水和剤 500 倍 (3 日前、9 回) でもよい ② イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ③ ハダニ類対策：コロマイト乳剤の 1000 倍 (前日、1 回) を加用する。	

(参考) 有袋次回 (9 月上旬) 薬剤散布予定：9/5～10 日頃 (前回より 20 日後)

🌟 無袋：8月上中旬の防除 (前回から 10 日後)

散布時期	8月 10～15 日 *オーロラ等の最終散布	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 1000ℓ 当り 展着剤 10mℓ ベルコートフロアブル 1000mℓ (14日前、5回) バリアード顆粒水和剤 (劇) 50g (前日、3回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ以上	
注意事項	① バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。 ② ハダニ類対策：コロマイト乳剤 1000 倍 (前日、1 回) を加用する。 ③ ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ④ オーロラ等はベルコートフロアブルに代えてキノンドーフロアブルを使用する。(収穫前規制のため)	

🌟 無袋：8月下旬の防除 (前回から 10 日後)

散布時期	8月 20～25 日	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 1000ℓ 当り 展着剤 10mℓ キノンドーフロアブル 1000mℓ (3日前、9回) イカズチWDG (劇) 66g (前日、3回)	◆ 散布量： リットル
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ以上	
注意事項	① イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。	

(参考) 無袋次回 (9 月上旬) 薬剤散布予定：9/5～10 頃 (前回より 15 日後)

◆ 共通注意事項

- ① 葉やけ防止のため、高温時の散布はしない。
- ② キノンドーフロアブルを使用する際は、容器の口を下に向けて横に回しながら上下に振り、容器内でよく溶かしてから SS 等のタンクへ投入する。