

りんご中晩生種栽培管理について



平成 30 年
JA 中野市園芸課

下記の内容を参考にして、中生種以降の栽培管理を進めてください。尚、栽培地域や土壌条件（排水性）等の外的要因でも管理時期等が変わってきます。詳細につきましては、園芸課技術担当までお問い合わせください。

🍎 千秋の管理について

1. 除袋時期 8 月末まで
2. 落果防止 ストッポール液剤 1000 倍
8 月 30 頃に散布（展着剤は加用しない）
* 野菜や他品目には絶対かけない（薬害発生防止）
3. 収穫予想 9 月 15 日頃～

🍎 秋映の管理について

1. 葉摘み方法 9 月 10 日過ぎに果実密着葉のみ軽く摘む
（葉の跡がつかない程度の軽い葉摘み）
2. 落果防止 ストッポール液剤 1000 倍
9 月 5 日頃に散布（展着剤は加用しない）
* 野菜や他品目には絶対かけない（薬害発生防止）
3. 解禁予想 9/25 頃（成熟調査を経て、収穫解禁日を設定します）

🍎 ジョナゴールド・世界の管理について

1. 除袋時期 9 月 10 日頃
2. 落果防止 ストッポール液剤 1000 倍
9 月 5～10 日頃に散布（展着剤は加用しない）
* 野菜や他品目には絶対かけない（薬害発生防止）
3. 収穫予想 ジョナゴールド：9 月 28 日頃～
世界一 : 9 月 28 日頃～

【落花防止剤使用上の注意点】

- ① 落果防止剤ストッポール液剤は収穫開始予定日の 15～25 日前に 1 回散布が基本です。
- ② 散布の際は、展着剤使用しないでください。また、使用規制収穫 7 日前を厳守してください。（最新情報やラベル等を良く確認してください。）
- ③ 落果防止剤の「ストッポール液剤」は、土壤乾燥条件では効果が低下します。9 月以降土壤乾燥状態が続く場合は、適度なかん水を実施し、園内の湿度を上げてから散布してください。

紅玉の管理について

1. 落果防止 ストッポール液剤 1000 倍
9 月 5 頃に散布（展着剤は加用しない）
*野菜や他品目には絶対かけないこと（薬害発生防止）
2. 収穫予想 9 月 25 日頃～

半無袋（ワックス袋）ふじの除袋について

1. 除袋時期 9 月 15 日～20 日頃までに
2. 注意点 極端な高温（強日照）が続く場合は、上記の日程より遅らせる。
園地場所や土質によっても違います。詳しい時期は担当技術員までお問い合わせください。

シナノスイートの管理について

1. 芯かび果除去 8 月下旬～9 月 10 日頃
①異常に地色の抜けた果実の除去。
②早期着色果実の除去。
③本格的な着色期を迎える前に積極的に実施する。
2. 葉つみ方法 着色が始まったら葉つみを開始する ⇒ 着色前には行なわない
3. 収穫予想 南部地帯 10 月 3 日頃～、北部地帯 10 月 5 日頃～
果肉成熟が進む事が予想されます。果肉鮮度を重視して収穫を進めてください。

シナノゴールドの管理について

1. 落果防止 ストッポール液剤 1000 倍
9 月 20 日～25 日頃に散布（展着剤は加用しない）
*毎年落果のない場合（園）は必要なし
*野菜や他品目には絶対かけない（薬害発生防止）
2. 収穫予想 南部地帯 10 月 10 日頃～、北部地帯 10 月 15 日頃～
中長期的な貯蔵が可能な熟度での収穫を徹底してください。

