

もも・ネクタリン特報

【定期散布】

- ・隣接する園地や収穫中の作物に飛散しないよう十分注意する。
- ・すでに収穫が終了している園地（樹）には、この散布を行なう必要はありません。



もも

散布時期：前回散布から15日後（8月24日～9月2日頃）

＊極晩生種（白根白桃等）で除袋間近な場合は、除袋後に散布を実施して下さい。

幸茜の収穫は8/30頃、除袋終了目安は8/20頃となる予想です。

選抜白根白桃の収穫は9/5頃、除袋終了目安は8/26頃となる予想です。

散布薬剤：	水	100%
	展着剤	20ml
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、3回）

散布日	月	日
散布量		リットル

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病

10a 当り散布量：600%

【注意事項】

- ① シンクイムシ類などの害虫発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍（前日、3回）を加用散布する。

ネクタリン

散布時期：前回散布から15日後（8月20日～29日頃）

＊ファンタジアの収穫開始は8/20頃となる予想です。

散布薬剤：	水	100%
	展着剤	20ml
	ベルコートフロアブル	50ml（前日、2回）

散布日	月	日
散布量		リットル

対象病害虫：灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病

10a 当り散布量：600%

【注意事項】

- ① シンクイムシ類などの害虫発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍（前日、3回）を加用散布する。