



1. 気象概況（中野市長丘地区気象ロボット観測データによる）

| 旬別<br>月間   | 上旬   |      | 中旬   |      | 下旬    |      | 月間    |       | コメント       |
|------------|------|------|------|------|-------|------|-------|-------|------------|
|            | 本年   | 平年   | 本年   | 平年   | 本年    | 平年   | 本年    | 平年    |            |
| 8 月平均気温（℃） | 26.0 | 25.4 | 23.1 | 24.6 | 25.9  | 23.0 | 25.0  | 24.3  | 月間平年比+0.7  |
| 8 月降水量（mm） | 3.5  | 51.6 | 55.5 | 62.7 | 108.5 | 68.8 | 167.5 | 183.1 | 月間平年比 91%  |
| 8 月日照量（h）  | 77.4 | 71.1 | 63.8 | 58.7 | 49.2  | 53.8 | 190.4 | 183.6 | 月間平年比 104% |

● 8 月気象特記 \*最高 37.1℃ (8/22) 真夏日：17 猛暑日：6 豪雨：8/25 78.0mm 低温：8/18 10.6℃ 強風：18.4m/s(8/24)

参考（7 月）：平均気温 26.0℃（極高・過去最高！）猛暑日 7 日、降水量平年比 61%（極小）、日照量平年比 150%（極多）

- 上旬（平年比）：気温（高）+0.4℃、降水量(極小) 7%、日照量（多）109%
- 中旬（平年比）：気温（低）-1.5℃、降水量（並）89%、日照量（多）109%
- 下旬（平年比）：気温（高）+2.9℃、降水量（多）158%、日照量（少）91%

2. 品目別生産の経過・病虫害発生状況・今後の対策

ハウス 2018

- ◆ サクランボ：被覆棟数 38 棟（面積 354a）5/17 出荷ピーク。6/18 出荷終了。最終 16,197kg。（昨年比 95%）
- ◆ もも（1 棟）：初出荷 4/26（日川白鳳）⇒ 6/1 終了 ⇒ 生産量：前年比 92.5%（小玉傾向）
- ◆ ぶどう：初出荷 4/23。出荷量前年比 SM147%、NP211%、有核 84%、種なし 95%（8/30 現在）

露地品目 2018

- 収穫開始予想：なつっこ 8/5、川中島 8/21、白根 9/5、オーロラ 8/20、南水 9/7、ラフ 9/18、つがる 8/17、秋映 9/25、スイート 10/5
- もも：成熟遅延・着色不良（高温、干ばつの影響大）。核割れ多。8/23～24 強風によりスレ・打撲によるロス発生。
- もも：8/29 選果（700c/s 川中島白桃）玉流れ：16>15>20>18 平均糖度：13.3% 陽だまり率 30%
- ぶどう：成熟昨年比 7 日早い。高糖度・小粒傾向。秋雨の影響により一部裂果・晩腐病発生あり。
- ナシ類：玉肥大不足顕著。葉焼け症が全域で多発 ⇒ 極度の干ばつによる水分ストレス・ハダニ類多発が要因か
- りんご：つがる玉肥大良好。連続高温で着色不良顕著⇒盆後の低温でやや上昇。収穫ピークが 8 月末見込み。
- 日焼け：重度の症状が多発。りんご・ぶどう・ナシでは生産量に影響あり
- 腐敗性病害：炭そ病（りんご）無、灰星病（もも等）無
- 黒とう病：シャイン M で 7/10～発生。全体の発生量は昨年より少ない模様。
- せん孔細菌病：管内広域で、果実病斑が多発。
- 黒星病：新梢葉への感染目立つ ⇒ 秋季(9 月)防除強化必要
- シンクイムシ類：8 月上旬～プラム等で第 3 世代被害増加 ⇒ 盛夏期の実害は昨年より少ない模様
- ハダニ類：7 月中旬から断続発生。りんごでは全域で多発。葉の落葉が散見 ⇒ お盆以降は小康状態。
- カメムシ類：8 月の被害は昨年より少ない。 \*5 月の果実吸汁被害が多かった
- 生産量（昨年比）：貴陽 123%・もも 90%・南水 85%・ラフ 90%・りんご中生 100%・ふじ 100% \*8/20 現在
- 肥大調査 8/15（昨年比）りんご 110%、南水 108%、ラフ 118%

薬剤散布 2018

- りんご：8/1～5 コロマイト+エクシレル SE（新）+ダイパワー水和剤 \*ダイパワー前日まで使用可に！（7/3 付け）
- りんご：8/15～20 フリント F+イカズチ WDG+オマイト水和剤+アリエッティ C 水和剤（黒星病対策追加・前日まで）
- りんご：9/1～5 ストライド+ダントツ ⇒ 9/15～20 ベフラン液剤 ⇒ 9/25～10/5 アリエッティ C 水和剤
- もも：8/10～20 オーシャイン F+サムコル F \*晩生種（川白等）最終散布
- もも：8/25～9/5 ベルクート F \*極晩生種（白根等）最終散布
- プラム：8/10～15 オルフィンプラス F+アーデント F \*中晩生種散布（太陽最終）
- ナシ類：8 月上中旬 和梨（8/5～10）西洋梨（8/15～20） ⇒ 8 月下旬 和梨（8/20～25）
- ぶどう：8 月中旬 ic ボルドー66D+ビックマグ \*ic ボルドーに代えて、サコイド 3000 又はムッシュボルドーも可