

【せん孔細菌病対策 収穫後の薬剤散布】 収穫中の作物、隣接園への飛散（農薬汚れ）に注意

- もも

(収穫前の品種・その他作物にかからないよう、ご注意ください)

コサイド 3000 体系

次頁もご覧ください

ネクタリン

下記のいずれかを選択して散布下さい。
(収穫前の品種・その他作物にかからないよう、ご注意下さい)

ボルドー体系

コサイド 3000 体系

散布時期：9 月中下旬		
散布薬剤：	水	1 0 0 リットル
	アビオン E (固着性展着剤)	1 0 0 ml
	I C ボルドー 412	3 . 3 k g
対象病害虫：せん孔細菌病		
散 布 量：1 0 a 当り 6 0 0 リットル		

散布時期：9 月中下旬		
散布薬剤：	水	1 0 0 リットル
	アビオン E (固着性展着剤)	1 0 0 ml
	コサイド 3 0 0 0	5 0 g
対象病害虫：せん孔細菌病		
散 布 量：1 0 a 当り 6 0 0 リットル		
＊コサイド 3000 に代えて、ムッシュボルドー DF の 500 倍を使用してもよい。		
＊薬害の発生が心配される場合は、クレフノンの 100 倍を加用する（ただし、汚れに注意）		

【注意事項】
アビオン E に代えて、KK ステッカーの 3000 倍でもよい。
＊KK ステッカーは調合液をよく攪拌させながら必ず最後に加用する。
①台風等で強風・降雨が予想される場合は、風雨前の予防散布を徹底する。
②コスカシバの発生園は、フェニックスフロアブルの 500 倍（開花期まで・1 回）を樹幹および主枝にていねいに散布する。

散布日	月	日
散布量		リットル

毒物・劇物をご購入の際は、印鑑をご持参ください

●秋雨による果実腐敗性病害（灰星病など）の発生が心配されます。

今後、収穫を迎える品種においては、オンリーワンフロアブルの 2,000 倍、オーシャインフロアブルの 2,000 倍など、殺菌剤の特別散布を実施しましょう。