

2019 年度 西洋梨【有袋版】病虫害防除暦

JA 中野市営農センター  
JA 中野市ナシ部会

- ◆ 無袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。
- ◆ 有袋・無袋共通:キノドー顆粒水和剤に代えて、キノドーフロアブルでもよい。

| 散布日    | 散布時期                         | 使用薬剤名                                            | 使用量                          | 収穫前<br>使用<br>時期  | 年間<br>使用<br>回数 | 10a当り<br>散布量<br>(ℓ) | 対象病虫害                                        | 注 意 事 項                                                                                                                      |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 月<br>日 | 第 1 回<br>3月下旬<br>(発芽前)       | (水88ℓ)<br>スプレーオイル<br>石灰硫黄合剤                      | 2ℓ<br>10ℓ                    | 発芽前<br>発芽前       | —<br>—         | 300                 | 腐らん病<br>ハダニ類<br>カイガラムシ類                      | ① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加<br>ようし、よく攪拌する。<br>② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤<br>の 1000 倍(前日、6 回)でもよい。                                   |
| 月<br>日 | 第 2 回<br>開花期<br>4月下旬         | 展着剤<br>サムコルフロアブル10<br>トップジンM水和剤                  | 10mℓ<br>20mℓ<br>100g         | 前日<br>前日         | 3回<br>6回       | 300                 | 腐らん病<br>輪紋病<br>ケムシ類<br>ハマキムシ類                | ① 訪花昆虫に充分に注意する。<br>② 赤星病対策<br>オンリーワンフロアブル 2,000 倍(前日、3 回)を<br>加用する。                                                          |
| 月<br>日 | 第 3 回<br>5月上旬<br>(前回 15 日後)  | 展着剤<br>ベンレート水和剤<br>モスピラン顆粒水溶剤                    | 10mℓ<br>50g<br>25g           | 前日<br>前日         | 4回<br>3回       | 400                 | 輪紋病<br>胴枯病<br>アブラムシ類                         | ① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布し<br>ない。                                                                                                 |
| 月<br>日 | 第 4 回<br>5月下旬<br>(前回 15 日後)  | 展着剤<br>コルト顆粒水和剤<br>ジマンダイセン水和剤                    | 10mℓ<br>25g<br>200g          | 前日<br>30日前       | 3回<br>5回       | 400                 | 輪紋病・黒斑病<br>黒星病<br>アブラムシ類<br>カイガラムシ類          | ① アブラムシ類の発生が目立つ場合は今回の<br>散布を早める。                                                                                             |
| 月<br>日 | 第 5 回<br>6月上旬<br>(前回 15 日後)  | 展着剤 *①<br>ダーズバン DF *②<br>キノドー顆粒水和剤               | 10mℓ<br>33g<br>100g          | 30日前<br>3日前      | 3回<br>9回       | 500                 | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>クワコナカイガラムシ       | ① カイガラムシ類対策<br>アブロードフロアブルの 1000 倍 (30 日前、<br>2 回) を加用する。<br>② カメムシ類対策<br>ダーズバンDFに代えて、アルバリン顆粒水溶<br>剤の 2000 倍(前日、3 回)を使用する。    |
| 月<br>日 | 第 6 回<br>6月下旬<br>(前回 15 日後)  | 展着剤<br>シトラーフロアブル<br>スプラサイド水和剤                    | 10mℓ<br>100mℓ<br>66g         | 30日前<br>7日前      | 3回<br>3回       | 600                 | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>カイガラムシ類                    | ① 輪紋病対策<br>袋掛けの前に散布する。また、輪紋病感染防<br>止のため、散布後 3 日以内に袋をかける。<br>② ハダニ類対策:カネマイトフロアブル 1000 倍<br>(前日、1 回)を加用する。                     |
| 月<br>日 | 特別散布<br>7月初旬                 | 展着剤<br>オキシラン水和剤                                  | 10mℓ<br>200g                 | 3日前              | 9回             | 600                 | 輪紋病                                          | 🌱 輪紋病対策<br>袋掛けが遅れている場合は、今回の特別散布<br>を実施する。散布時期は前回より 10 日後を目<br>安とする。                                                          |
| 月<br>日 | 第 7 回<br>7月上旬<br>(前回 20 日後)  | 展着剤<br>ダーズバン DF<br>ナリアWDG *①                     | 10mℓ<br>33g<br>50g           | 30日前<br>前日       | 3回<br>3回       | 600                 | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類                     | ① ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュに<br>薬害を生じる恐れがあるので飛散しないよう<br>にする。<br>② シンクイムシ類対策<br>ダーズバン DF に代えて、バイスロイド EW2000<br>倍(7 日前、2 回)を使用する。 |
| 月<br>日 | 第 8 回<br>7月下旬<br>(前回 20 日後)  | 展着剤<br>スターマイトフロアブル *①<br>キノドー顆粒水和剤<br>オリオン水和剤 40 | 10mℓ<br>50mℓ<br>100g<br>100g | 前日<br>3日前<br>3日前 | 1回<br>9回<br>2回 | 600                 | 輪紋病<br>ハダニ類<br>シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>カイガラムシ類  | ① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフ<br>ロアブル 2000 倍(前日、1 回)でもよい。                                                                         |
| 月<br>日 | 第 9 回<br>8月中旬<br>(前回 20 日後)  | 展着剤 *②<br>ベルコートフロアブル<br>イカズチ WDG                 | 10mℓ<br>50mℓ<br>66g          | 14日前<br>前日       | 5回<br>3回       | 600                 | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類                      | ① オーロラ等の最終散布。<br>② ハダニ類対策<br>コロマイト乳剤の 1000 倍 (前日、1回)を加用する。                                                                   |
| 月<br>日 | 第 10 回<br>9月中旬<br>(前回 20 日後) | 展着剤 *②<br>ストロビードライフロアブル<br>ダントツ水溶剤               | 10mℓ<br>50g<br>50g           | 前日<br>前日         | 3回<br>3回       | 600                 | 輪紋病<br>シンクイムシ類<br>カメムシ類<br>ケムシ類<br>コナカイガラムシ類 | ① ラ・フランス・バラード等の最終散布。<br>② ストロビードライフロアブルに代えて、キノド<br>ー顆粒水和剤 1000 倍(3 日前、9 回)でもよい。                                              |

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（D F）⇒顆粒水和剤（WD G）⇒水和剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します