

2019 年度西洋梨【無袋版】病虫害防除暦

JA 中野市営農センター

JA 中野市ナシ部会

◆ 有袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。

散布日	散布時期	使用薬剤名	使用量	収穫前 使用 時期	年間 使用 回数	10a当り 散布量 (ℓ)	対象病虫害	注 意 事 項
月 日	第 1 回 3月下旬 (発芽前)	(水88ℓ) スプレーオイル 石灰硫黄合剤 * ①、②	2ℓ 10ℓ	発芽前 発芽前	— —	300	腐らん病 ハダニ類 カイガラムシ類	① 混用順:スプレーオイルに石灰硫黄合剤を加ようし、よく攪拌する。 ② 石灰硫黄合剤に代えて、トップジン M 水和剤の1000 倍(前日、6 回)でもよい。
月 日	第 2 回 開花期 4月下旬	展着剤 サムコルフロアブル 10 トップジンM水和剤	10mℓ 20mℓ 100g	前日 前日	3回 6回	300	腐らん病 輪紋病 ケムシ類 ハマキムシ類	① 訪花昆虫に十分に注意する。 ② 赤星病対策 オンリーワンフロアブル 2,000 倍(前日、3 回)を加用する。
月 日	第 3 回 5月上旬 (前回 15 日後)	展着剤 ベンレート水和剤 モスピラン顆粒水溶剤	10mℓ 50g 25g	前日 前日	4回 3回	400	輪紋病 胴枯病 アブラムシ類	① 訪花昆虫保護のため、指定薬剤以外散布しない。
月 日	第 4 回 5月下旬 (前回 15 日後)	展着剤 コルト顆粒水和剤 ジマンダイセン水和剤	10mℓ 25g 200g	前日 30日前	3回 5回	400	輪紋病・黒斑病 黒星病 アブラムシ類 カイガラムシ類	① アブラムシ類の発生が見られる場合は今回の散布を早める。
月 日	第 5 回 6月上旬 (前回 10 日後)	展着剤 * ① ダーズバン DF * ② キノンドー顆粒水和剤	10mℓ 33g 100g	30日前 3日前	3回 9回	500	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	① カイガラムシ類対策 アブロードフロアブルの 1000 倍 (30 日前、2 回) を加用する。 ② カメムシ類対策 ダーズバンDFに代えて、アルバリン顆粒水溶剤の 2000 倍(前日、 3 回)を使用する。
月 日	第 6 回 6月中旬 (前回 10 日後)	Ic ボルドー412 * ①	3. 3kg	—	—	600	輪紋病	① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の 500 倍(3 日前、9 回)でもよい。
月 日	第 7 回 6月下旬 (前回 10 日後)	Ic ボルドー412 * ① スプラサイド水和剤	3. 3kg 66g	— 21日前	— 2回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	① IC ボルドー412 に代えてのオキシラン水和剤の 500 倍(3 日前、9 回)でもよい。
月 日	第 8 回 7月上旬 (前回 10 日後)	展着剤 バイスロイドEW ナリアWDG * ①	10mℓ 50mℓ 50g	7日前 前日	2回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類	① ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 ② ハダニ類対策:カネマイトフロアブル 1000 倍(前日、1 回)を加用する。
月 日	第 9 回 7月中旬 (前回 10 日後)	展着剤 ベルクートフロアブル * ①	10mℓ 50mℓ	14日前	5回	600	輪紋病	① ベルクートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。
月 日	第 10 回 7月下旬 (前回 10 日後)	展着剤 * ① スターマイトフロアブル キノンドー顆粒水和剤 オリオン水和剤40	10mℓ 50mℓ 100g 100g	前日 3日前 3日前	1回 9回 2回	600	輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 ハダニ類	① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフロアブル 2000 倍(前日、1 回)でもよい。
月 日	第 11 回 8月上旬 (前回 15 日後)	展着剤 ベルクートフロアブル * ① バリアード顆粒水和剤	10mℓ 50mℓ 50g	14日前 前日	5回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類	① ベルクートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。
月 日	第 12 回 8月下旬 (前回 15 日後)	展着剤 * ② キノンドー顆粒水和剤 イカズチ WDG	10mℓ 100g 66g	3日前 前日	9回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類	① オーロラ等の最終防除。 ② ハダニ類対策 コロマイト乳剤の 1000 倍(前日、1 回)を加用する。
月 日	第 13 回 9月上旬 (前回 15 日後)	展着剤 ベルクートフロアブル * ③ ダントツ水溶剤	10mℓ 50mℓ 50g	14日前 前日	5回 3回	600	輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 ケムシ類 コナカイガラムシ類	① バラード等の最終防除。 ② ベルクートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1000 倍(3 日前、9 回)でもよい。 ③ ベルクートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。
月 日	第 14 回 9月中旬 (前回 10 日後)	展着剤 ストロビードライフロアブル	10mℓ 50g	前日	3回	600	輪紋病	① ラ・フランス等の最終防除。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（DF）⇒顆粒水和剤（WDG）⇒水和剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

当防除暦の複製・コピーを禁止します