

2019年版 水稻除草剤防除基準

散布時期 雑草条件	-7日 代かき	0日 田植え	+5日	+10日	+15日	+20日	+30日	
雑草の多い水田 1年生雑草 マツバイ ホタルイ 多発田	<体系処理> 初期+中期 初期+初・中期一発 代かき後2～5日以内で 田植をされる方		初期除草剤 農将軍フロアブル500ml 移植直後～ノビエ1.5葉期まで メテオフロアブル500ml 移植直後～ノビエ1.0葉期まで (ただし、移植後30日)			初・中期一発除草剤 ビクトリーZフロアブル 500ml 移植後5日～ノビエ3葉期まで		中期除草剤 マメットSM粒剤3kg 移植後15日後～ノビエ3.5葉期まで (ただし、移植後30日まで)
			省力型体系 ピラクロンジャンボ300g (30g×10個) 移植直後～ノビエ1.5葉期まで (ただし、移植後30日まで)			キマリテジャンボ300g (30g×10個) 移植後5日～ノビエ3葉期まで (ただし、移植後60日まで)		マメットSMジャンボ1kg (50g×20個) 移植後20日後(稲5葉期以降)～ノビエ3.5葉期まで (移植後30日まで)
雑草の多い水田 クログワイ オモダカ 多発田	<体系処理> 初期+中後期一発		初期除草 ピラクロンフロアブル500ml 移植直後～ノビエ1.5葉期まで (ただし、移植後30日まで)			中後期一発除草剤 レプラス1キロ粒剤 移植後14日～ノビエ4葉期まで (ただし、収穫前60日まで)		クリンチャーバスME液剤 水70～100ℓに1000ml 落水散布 移植後15日～ノビエ5葉期まで (収穫50日前まで)
雑草の少ない水田	<一発処理> 初・中期一発 代かきから移植まで 5日以内		バッチリLX1 ^キ 粒剤1kg 移植直後～ノビエ2.5葉期まで (ただし、移植後30日まで) イネキングフロアブル500ml 移植直後～ノビエ2.5葉期まで (ただし移植後30日まで)					グラスジンMナトリウム粒剤 3～4kg 落水散布 クログワイ対象外 有効分げつ終止期～幼穂形成期前 (収穫60日前まで)
新 省力型 豆つぶ体系			クミスターL豆つぶ250g(省力型) 移植3日～ノビエ2.5葉期まで (ただし、移植後60日まで)			アトリ豆つぶ250 (250g) 移植後20日後(稲5葉期以降)～ノビエ4.0葉期まで (ただし収穫45日前まで)		ワイドアタックSC 水100ℓに100ml 落水散布 移植後20日(稲5葉期以降)～ ノビエ6葉期まで (収穫30日前まで)

- * 代かきから田植えまで7日以上日数が開く場合は、初期除草剤(農将軍フロアブル、メテオフロアブル等)を代かき後、水が濁っているうちに散布する。
- * ホタルイ、コナギ対策: イネキングフロアブル、キマリテジャンボ、レプラス1キロ粒剤はSU抵抗性雑草のホタルイやコナギ類の他にオモダカ等にも有効。また、イネキングフロアブルは畦畔から侵入するアシカキ等にも有効。
- * 広葉雑草対策: バッチリLX1^キ粒剤は田植同時散布が可能であり、SU抵抗性雑草(ホタルイ、コナギ、アゼナ等)を含め広範囲の雑草に有効。
- * アオミドロ、ウキクサ、藻類、表層剥離に対しては農将軍フロアブルが有効。ヒルムシロには、モゲトン粒剤が有効で、移植後20～25日に10a当り3～4kg散布する。
- * ワイドショット1^キ粒剤は、オモダカ、クサネム(草丈20cm以下)対策としても有効。
- * クサネム対策: ノミニー液剤10a当り水100ℓに原液50～100mlを落水散布または、ごく浅くして散布する。使用時期は、移植後30日～クサネムの草丈40cmまで。ただし、収穫60日前まで

水田刈跡または耕起前の水田及び畦畔

使用方法	除草剤名	対象雑草	10a当り使用量		適期場所	使用時期・回数	注意事項
			薬量	水量			
茎葉処理	ザクサ液剤	1年生	300～500ml	100～150ℓ	耕起前の水田	耕起前(雑草生育期 草丈30cm以下、1回)	・雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布する。 ・稲や他作物にかからないように散布する。
		1年生、多年生	500～1000ml				
	タッチダウンIQ	1年生	250～500ml	25～100ℓ	水田刈跡	水田作物刈取後(1回) (雑草生育期)	
		多年生	500～1000ml				

**当防除暦
複製・コピー
禁止**

使用方法	除草剤名	対象雑草	10a当り使用量		適期場所	使用時期・回数	注意事項
			薬量	水量			
茎葉処理	ザクサ液剤	1年生 1年生、多年生	300～500ml 500～1000ml	100～150ℓ	耕起前の水田 水田畦畔	耕起前(雑草生育期 草丈30cm以下、1回) 雑草生育期(草丈30cm以下、収穫7日前、2回以内)	雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布する。 稲や他作物にかからないように散布する。
	タッチダウンIQ	1年生 多年生	250～500ml 500～1000ml	25～100ℓ	水田刈跡	水田作物刈取後(1回) (雑草生育期)	