



# ぶどう特報

No. 1 2019. 3. 29  
J A 中野市営農センター  
J A 中野市ぶどう部会

粗皮削り、藁はずしは一回目の防除前に行って下さい。(4月の月上旬頃)  
ぶどう苗木植え付けは4月中旬頃に実施する。(各地区講習会を実施します)

発芽予想日	昨 年	南 部	北 部
巨 峰	4月22日	4月25日頃?	4月28日頃?
シャインマスカット	4月27日	4月30日頃?	5月2日頃?

## 休眠期特別散布

散布時期	4月上旬(ブドウトラカミキリ発生園…枝の髓が食害されているもの)		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	展着剤(ハイテンパワー)	20 ml	
	ラビキラー乳剤(劇物) (休眠期・2回以内)	500 ml	
散布量	300ℓ / 10a		
適用病害虫	ブドウトラカミキリ		
注意点	<ul style="list-style-type: none"> <li>ラビキラー乳剤は訪花昆虫に影響があるので早朝散布を厳守する(4月上旬)</li> <li>散布前に粗皮削りを実施し、主幹にしっかりかかるよう散布する。</li> <li>※晩腐病心配な方はベンレート水和剤(200倍、休眠期、1回)を混用してもよい。</li> </ul>		

## ◎石灰硫黄合剤の使用について◎

ハダニ発生園は、石灰硫黄合剤20倍(100ℓに5ℓ)の散布で発生密度を下げるすることができます。

### 発芽前散布農薬との混用表

薬剤名	使用倍率	対象病害	合剤と混用
ベンレート水和剤	200倍	晩腐病◎ 黒とう〇	〇
デランフロアブル	200倍	晩腐病〇 黒とう◎	×
パスポートフロアブル	250倍	晩腐病〇 黒とう〇	×

## 第1回ぶどう定期散布

散布時期	4月下旬頃(発芽直前(芽がふくらんだ頃))	南部:4/20~	北部:4/23~
		シャインマスカット・クイーンルージュ	露地巨峰・他品種
散布薬剤	水 100 ℓ アビオン-E(展着剤) 100ml ①デランフロアブル 500ml (休眠期・1回)	水 100 ℓ アビオン-E(展着剤) 100ml パスポートフロアブル 400ml (休眠期・1回)	
散布量	10a 当り 300ℓ	10a 当り 300ℓ	
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・つる割れ病	晩腐病・黒とう病	
注意点	① デランフロアブルは人によりかぶれる恐れがあるので注意する。 ② 他園地や隣接するハウスビニールへの飛散注意。(汚れ) ③ りんご・もも等に薬剤がかかると薬害・落花が発生するので注意する。 ④ 隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡してください。(ドリフト注意) ⑤ デランフロアブルは薬害の発生が心配なため、発芽前に必ず散布する。	散布日	月 日
		散布量	ℓ

ご不明な点があれば、ぶどう担当までご連絡ください

次回特報配布は4月17日(水)です

◎2019年度 ぶどう防除暦採用農薬登録一覧表 (一印は規制なし ×印は登録なし)

農薬名	りんご	もも	なし	プラム	おうとう サクランボ	アスパラガス	きゅうり
ラビキラー乳剤	30日前	休眠期	×	×	休眠期	×	×
ベンレート水和剤	前日	前日	前日		3日前	前日	前日
デランフロアブル	60日前	7日前	60日前	×	収穫終了～ 落葉期	×	×
オンリーワンF	7日前	前日	前日	前日	前日	×	×
モスピラン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
ダ イゾ ノ水和剤 34	30日前	前日	14日前	21日前	14日前	×	×
オーソサイド水和剤	14日前	発芽前	3日前	21日前	14日前	×	前日
ドーシャスF	×	前日	×	×	×	×	前日
ストマイ液剤	×	60日前	×	×	×	×	×
フラスター液剤	×	×	×	×	×	×	×
フルーツセイバー	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
コテツフロアブル	前日	前日	前日	前日	14日前	前日	前日
スイッチ顆粒水和剤	×	×	×	×	×	×	×
ゾ マダ イソ水和剤	30日前	21日前	30日前	×	21日前	収穫終了後 秋期まで	前日
フェニックスフロアブル	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
アドマイヤ-顆粒水和剤	3日前	3日前	3日前	21日前	×	前日	前日
ペンコゼプF	×	×	×	×	×	×	前日
ザンプロDMF	×	×	×	×	×	×	前日
アミスター10F	45日前	前日	前日	前日	前日	×	×
ディアナWDG	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ライメイフロアブル	×	×	×	×	×	×	前日
アーデントF	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ムツボルド-D F	×	開花前まで	×	葉芽発芽前 まで	収穫後	—	—
アルパ リン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
スターマイトF	前日	前日	前日	前日	前日	×	前日
ICボルドー66D	×	—	×	×	—	収穫終了後	×
テルスター水和剤	前日	14日前	前日	×	×	×	前日

※平成30年3月現在の状況です。

※農薬使用の際はラベルをよく読み、登録内容を確認してから使用・散布するようにして下さい。

毎年、薬剤飛散（ドリフト）による事故が発生しています。  
畑に隣接している農作物には絶対飛散しない様にSS操作の確認をし、防除ネット等を設置し十分注意して下さい。

不明な点はお近くの事業所、または営農センターまでお問い合わせ下さい。  
**薬剤散布をしたら栽培日誌に記入しましょう。（4月配布予定）**