

ぶどう特報No.3



No.3 2019.4.25
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

南部の早いところで巨峰の発芽が始まりました。4月下旬の雨は黒とう病を助長します。展葉2～3枚の防除が重要になりますので実施遅れのないように注意しましょう。

シャインマスカット発芽予想	昨年 4月29日	南部 5月1日頃?	北部 5月4日頃?
---------------	----------	-----------	-----------

第3回 シャインマスカット・クイーンルージュ定期防除（黒とう病対策防除）

散布時期	展葉2～3枚（5月上中旬頃）	南部：5/8頃～	北部：5/11頃～（シャイン）
散布品種	シャインマスカット、シャインマスカット混植園		
散布薬剤	水 展着剤（ハイテンパワー） オンリーワンフロアブル 劇ダイアジノン水和剤34	100 ℓ 10 ml （前日・3回）50 ml （30日前・2回）100 g	散布日 月 日
散布量	300ℓ／10a		
適用病害虫	黒とう病・うどんこ病・灰色かび病・晩腐病・（ツマグロアオカスミカメ）		
注意点	※黒とう病重要防除。散布忘れ・遅れのないよう実施する。 ①巨峰などの品種は降雨が多い場合キノンドーフロアブル600倍（45日前まで、4回（開花後は1回））を散布する。その際、ビニールや家屋への飛散に注意する（汚れ） オンリーワン散布時期（園内3割が右の写真の頃）⇒		



第4回ぶどう定期防除【今回から10日間隔で防除】

散布時期	展葉6枚頃（5月中旬）	南部：5/13～	北部：5/15～（巨峰）
散布品種	全品種		
散布薬剤	水 展着剤（ハイテンパワー） オーソサイド水和剤80 ※マルポロン（有核） ※グリーンデイズ または ビッグマグ（種なし）	100 ℓ 10 ml （30日前・2回）125 g 花振り防止 100 g 微量要素補給等 100 g 葉色向上 100 g	散布日 月 日 こちらは葉面散布剤です。混用推奨。
散布量	300ℓ／10a		
適用病害虫	晩腐病・べと病・灰色かび病・黒とう病		
意点	①カイガラムシ・カスミカメムシ・（クロヒメゾウムシ）発生園はコルト顆粒水和剤3,000倍（前日、3回）を加用する。 ②オーソサイド水和剤に代えてアリエティC水和剤800倍（30日前、2回）を使用しても良い。但し、オーソサイドとアリエティCの一成分は同じため、使用回数に注意する。（両剤合わせて2回まで） ③オルガミンDA1,000倍（葉面散布剤）は今回から加用して使用してもよい		