

プラム・ブルーング特報 No.3

平成 31 年 4 月 17 日
J A 中野市営農センター
J A 中野市プラム部会

4 月上旬は気温の変動が激しく、降雪なども影響し、生育は停滞しています。現状は、平年並みに推移し、品種間の開花状況は狭く思われます。

(平岡で太陽の開花始め、4 月 13 日頃、平年 4/14)

今後、落花期の防除は黒斑病・かいよう病対策として重要ですので、落花後の農薬散布が遅れないよう注意しましょう。
(授粉作業、凍霜害対策は万全に！！)

落花後の散布目安 (品種により差があります。園の状態を確認し)

(南部 4/25 頃から * 北部 4/28 頃から)

薬剤散布 * 他作物にはかからないようにする。

プラム			
散布時期:	落花後～5 月上旬		
散布薬剤:	水	100ℓ当り	
	展着剤	10ml	
	オルフィンプラスフロアブル	33ml	(前日、3回)
	アグレプト水和剤	100g	(30日前、2回)
対象病虫害:	灰星病、黒斑病、(かいよう病)		
散布量:	10a当り SS400ℓ 動噴500ℓ		

・ 散布日	4 月	日
・ 散布量		ℓ

①シンクイムシ類の発生が心配な場合はフェニックスフロアブル 4000 倍(前日、2回)を加用散布する。

②オルフィンプラスフロアブルに代えてオーシャインフロアブル 3,000 倍(前日、3回)でもよい

ブルーング			
散布時期:	落花後～5 月上旬		
散布薬剤:	水	100ℓ当り	
	展着剤	10ml	
	フルーツセイバー	66ml	(前日、3回)
	サムコルフロアブル 10	40ml	(3日前、3回)
対象病虫害:	灰星病		
散布量:	10a当り SS400ℓ 動噴500ℓ		

・ 散布日	月	日
・ 散布量		ℓ

①スモモヒメシンクイ越冬世代成虫の発生があるため、散布の際は死角が生じないように注意する。