



せん孔細菌病 多発注意

現在、せん孔細菌病発生地域を中心に春型枝病斑が散見されております。特に 5 月末までは、潜伏している越冬菌が、日々枝病斑として発現しますので、下記を参考に、引き続き、春型枝病斑の切除・薬剤散布等、総合的な防除を徹底して下さい。

① 春型枝病斑を除去する（この作業を徹底しないと、菌密度は減りません。必ず実施下さい。）



現在、散見されている枝病斑は、左図のような枝先端の枯死症状が多い傾向です。
このような症状の枝は、直ちに切除して下さい。

春型枝病斑

枯れこみ、シワを生じる。
樹液が出る場合もある。
表皮を削ると、褐変している。
一度、発芽・開花した後に、枯れている症状。

切除位置・・・枝病斑ギリギリではなく健全な芽を 1 つ含めて切除する。

② 薬剤の散布間隔は 10～14 日以内を厳守する

* 散布予定日に降雨が続くと予想される場合は防除を前倒しで行ない、薬剤の散布間隔が空かないよう注意する。
(薬剤については、もも特報を参照)

③ 「樹上かん水 (畑灌)」を可能な範囲で止める

りんご薬剤摘果について (参考)

- ◆ 散布時期 (目安) : 5/17～22 頃 * 満開 14～16 日後
- ◆ 中心果の横径が 10～12mm 程度 * 測定位置 : 目通りの高さ

水	100 リットル	500 リットル	600 リットル	1,000 リットル
アプローチ B I (333 倍)	300ml	1500ml	1800ml	3000ml
劇ミクロデナポン水和剤 85 (1200 倍)	83g	415g	498g	830g

注意事項

- ① 展着剤 : アプローチ BI に代えて、ニーズ 1000 倍でもよい。
- ② ミクロデナポン (水) は果皮、果柄や果台から発生した新梢 (葉) から多く吸収される。よって、果実及び花そう葉に十分かかるように散布する。
- ③ 散布量が少ないと効果が落ちる場合があるので、多めに設定する。
- ④ 結実が悪い園、毎年生理落果の多い樹や園、極端に樹勢が弱い樹、強い樹は散布しない。
- ⑤ ミクロデナポン水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑をお持ちください。

次頁は、2019 もも・ネクタリン収穫開始期予想一覧を掲載しております。ご覧下さい。

もも・ネクタリン収穫開始期予想一覧表

J A 中野市園芸課

○平岡地区の収穫開始期予想です。南部地区は、2～3 日程度早まります。

○本年満開日 白鳳 4/24 ファンタジア 4/23 （平岡地区）

○収穫開始期の予測は、満開後成熟日数を基本に調整を加えた期日、収穫ピークは開始期より 3～5 日後。

●成熟期は、平年並みまたは平年よりもやや遅れると予想されます。
今後の気象状況（満開後 40 日までの平均気温。収穫前の気温・日照量、降水量など）によって前後しますので、
管理作業の参考としてご活用ください。

品種名	本年	平年	H30	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23	H22
サマークリстал	7/18	7/18	7/16	7/22	7/11	7/16	7/21	7/20	7/21	7/24	7/21
晶光	8/4	8/2	8/1	8/6	7/27	8/1	8/6	8/8	8/10	8/11	8/8
フレーバー・T	8/15	8/15	8/15	8/21	8/8	8/15	8/19	8/16	8/20	8/20	8/16
和手	8/19	8/20	8/19	8/22	8/12	8/19	8/23	8/22	8/26	8/26	8/23
ファンタジア	8/28	8/27	8/25	9/7	8/21	8/25	8/31	9/1	9/4	9/2	8/31
秀峰	9/9	9/9	9/8	9/11	9/2	9/8	9/13	9/10	9/13	9/12	9/10
日川白鳳	7/17	7/15	7/13	7/18	7/8	7/13	7/17	7/18	7/20	7/22	7/19
たまき	7/17	7/15	7/13	7/18	7/9	7/13	7/17	7/18	7/20	7/22	7/18
赤宝	7/17	7/16	7/13	7/19	7/10	7/13	7/18	7/20	7/22	7/23	7/19
日の出(中生系)	7/24	7/22	7/20	7/23	7/18	7/20	7/24	7/26	7/28	7/31	7/28
秘味黄金	7/27	7/24	7/22	7/27	7/19	7/22	7/27	7/29	8/1	8/3	7/28
白鳳(在来系)	7/28	7/28	7/26	8/1	7/21	7/26	7/30	8/2	8/5	8/6	8/2
白鳳(日の出)	7/31	7/29	7/27	8/3	7/23	7/27	8/1	8/3	8/6	8/6	8/4
あかつき	8/4	7/31	7/29	8/5	7/24	7/29	8/4	8/5	8/7	8/8	8/6
滝の沢G	8/7	8/1	8/1	8/9	7/30	8/1	8/4	8/6	8/8	8/9	8/3
山根白桃	8/15	8/13	8/10	8/17	8/6	8/10	8/14	8/15	8/18	8/20	8/19
長沢白鳳	8/12	8/12	8/9	8/16	8/2	8/9	8/13	8/14	8/17	8/18	8/17
なつっこ	8/12	8/12	8/8	8/14	8/3	8/10	8/13	8/14	8/16	8/18	8/18
おどろき	8/23	8/19	8/19	8/20	8/15	8/20	8/24	8/20	8/25	8/23	8/22
川中島白桃	8/23	8/22	8/21	8/24	8/13	8/22	8/24	8/25	8/29	8/27	8/27
ニュー黄金桃	8/24	8/22	8/23	8/25	8/13	8/23	8/25	8/25	8/29	8/29	8/28
黄金桃	8/26	8/24	8/25	8/27	8/16	8/25	8/27	8/28	8/30	8/30	8/29
ニュー黄貴妃	9/8	—	9/6	9/8	8/29	9/7	9/8	—	—	—	—
選抜白根(岩戸系)	9/13	9/12	9/10	9/14	9/4	9/12	9/14	9/15	9/17	9/16	9/15
在来系白根白桃	9/17	9/16	9/13	9/19	9/8	9/15	9/18	9/19	9/22	9/19	9/19
ゴールデンピーチ	9/22	9/19	9/18	9/22	9/13	9/20	9/21	9/23	9/25	9/22	9/22