

# ぶどう特報No.4



No.4 2019.5.17  
JA 中野市営農センター  
JA 中野市ぶどう部会

生育は平年並みに推移中。種なしぶどうのストマイ液剤は散布遅れの内容に散布してください。

防除は予防を意識し、降雨が予想される日より前の散布を心がけましょう。

2019年	発芽（前年比）	開花（前年比）	満開（前年比）
本年（巨峰）	4月28日（+6）	6月8日頃（+6）	6月11日頃（+6）
本年（シャイン）	5月3日（+5）	6月13日頃（+5）	6月16日頃（+5）

## 第5回（第3回）ぶどう定期防除【前回から10日後】

散布時期	展葉9枚頃（5月下旬頃）		南部：5/23頃～	北部：5/25頃～（巨峰）	
散布品種	全品種				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml		
	ドーシャスフロアブル（60日前・3回）	50	ml		
	・ビッグマグ（種なし）	光合成向上	100	g	こちらは葉面散布剤 です。混用推奨。 ※どれか1剤混用
	・グリーンデイズ（種なし）	光合成・花振り防止	100	g	
・マルポロン（有核）	花振り防止	100	g		
・オルガミンDA（種なし）	樹体健全化	100	ml		
散布量	300ℓ/10a				
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・べと病				
注意点	① アブラムシ等の害虫発生がある場合はアディオン水和剤2,000倍（7日前、5回）を加用する。 ② 日中の高温時の散布は避け、気温が低く、風のない時に散布をする。 ③ 葉の表裏にしっかりかかるよう散布する。				

## 第6回【種なしぶどう必須散布】（ぶどうの種なし化）

散布時期	5月下旬（満開の14日前～開花始期）		南部：5/23～	北部：5/25～（巨峰）
散布品種	種なしぶどう全品種			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml	
	ストマイ液剤20（満開予定日の14日前～開花始期）	100	ml	
散布量	300ℓ/10a			
注意点	※種なしぶどうは必ず散布する（有核巨峰には絶対にかからないよう注意する） ※満開14日前は概ね展葉9枚頃になるので、生育状況を確認して散布する。 ① 花穂に当るように、散布前に誘引を実施する。 ② 種なし巨峰とシャインマスカットの混植園は開花時期が違うのでストマイの散布時期に注意する。（混植園は巨峰展葉11枚頃に合わせて散布をする（目安）） ③ ストマイ液剤は散布が開花期に近いほど効果が低くなるので散布遅れに注意。			

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。