

# ぶどう特報No.5



No.5 2019.5.17  
JA 中野市営農センター  
JA 中野市ぶどう部会

ストマイ液剤は「種なしぶどう」にする重要な薬剤のため、散布忘れや散布遅れのないよう注意して下さい。

## フラスター散布【全品種】（着粒安定・新梢伸長抑制）

散布時期	展葉 7 枚～11 枚頃 (5 月下旬～6 月上旬頃)	有核：南部：5/20 頃～ 北部：5/24 頃～ 種なし：南部：6/1 頃～ 北部：6/3 頃～	
散布品種	全品種		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	展着剤 (ハイテンパワー)	10 ml	
	フラスター液剤 下記参照	50～200 ml	
	・有核巨峰	125～200 ml	5/25 頃～ 散布
	・種なし巨峰	100 ml	6/1 頃～ 散布
・シャインマスカット	50 ml	6/10 頃～ 散布	
・カガハ-フル・ピオーネ等	125～200 ml	6/5 頃～ 散布	
散布量	1000～1500ℓ/10a (手散布)	3000ℓ/10a (露地巨峰) SS 散布	
注意点	※品種、散布方法により使用倍率、散布時期が違います。(登録厳守) ※有核巨峰は【ハイテンパワー】に代えて【アプローチBI 500倍】を使用する ① 日中の高温時は避けて散布する。		

## 第7回(第4回)【ぶどう定期防除】(黒とう病、晩腐病、スリップス類防除)

散布時期	前回から10日(開花3日前)	南部：6/3～ 北部：6/5～(巨峰)	
散布品種	全品種		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	展着剤 (ハイテンパワー)	10 ml	
	フルーツセイバー (7日前、3回)	66 ml	
	オーソサイド水和剤 80 (30日前、2回)	125 g	
	●スプラサイド水和剤 (14日前、2回)	66 g	こちらは葉面散布剤 です。混用推奨。 ※どれか1剤混用
	・ビッグマグ(種なし) 光合成向上	100 g	
	・グリーンデイズ(種なし) 光合成・花振り防止	100 g	
	・マルポロン(有核) 花振り防止	100 g	
・オルガミンDA(種なし) 樹体健全化	100 ml		
散布量	4000ℓ/10a (※今回から4000ℓ※)		
注意点	① 灰色かび病の発生園はゲッター水和剤1,500倍(45日前まで、3回)を散布する。 ② オーソサイド水和剤80に代えてアリエティC水和剤800倍(30日前まで、2回)を散布しても良い。(農家在庫がある場合) ③ <u>アリエティC水和剤とオーソサイド水和剤80の一成分が同一のため、散布回数に注意(合計2回まで)</u> ④ シャインマスカット園で昨年ハダニの発生があった園は、カネマイトフロアブル1,000倍(14日前まで、1回)を加用散布する。		

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。

次回特報は6月3日頃発行予定