



降雨が多くなり、晩腐・黒とう病が心配です。散布忘れ・遅れのないよう定期散布に散布を実施して下さい。

2019 年	開花	満開	落花
平 年（巨峰）	6 月 7 日	6 月 10 日	6 月 13 日
昨 年（巨峰）	6 月 2 日	6 月 5 日	6 月 8 日
本 年（巨峰）	6 月 8 日？	6 月 11 日？	6 月 14 日？
本年（シャイン）	6 月 13 日？	6 月 15 日頃？	6 月 18 日頃？

第 8 回【ぶどう定期防除】（晩腐病、黒とう病、スリップス類防除）

散布時期	前回から 10 日（落花直後）	南部：6/13～ 北部：6/15～（巨峰）			
散布品種	全品種				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	●コテツフロアブル	（60 日前、2 回）	50		ml
	スイッチ顆粒水和剤	（30 日前、2 回）	33		g
	ジマンダイセン水和剤	（45 日前、2 回）	100		g
散布量	400ℓ／10a				
注意点	① 昨年べと病多発生園はゾーベックエニケード5,000 倍（14 日前、2 回）を加用散布する。 ② ジマンダイセン・ペンコゼブの一成分は同一成分のため使用回数に注意する（合計 2 回まで） ③ 例年クビアカスカシバが発生する園は（劇物）パダンSG水溶剤1,500 倍（収穫 21 日前、5 回）を主幹部にしっかりかかるように加用散布する。（果粉溶脱の心配があるため小豆大頃までの散布とする。）				

☆房切りについて☆

房切りの時期が近くなってきております。このまま順調に生育が進めば早いところで巨峰を中心に房切り作業を下記の表を参考に実施して下さい。

品 種	房切り目安	目標粒数	目標房重
種なし巨峰	満開時 3.0 c m	30 粒程度	400 g
有核巨峰	満開時 7.0 c m	35 粒程度	350 g
シャインマスカット	満開時 3.5 c m	25～35 粒程度	550 g
ピオーネ	満開時 2.5 c m	25 粒程度	400 g
ナガノパープル	満開時 3.0 c m	30 粒程度	400 g
クイーンニーナ	満開時 3.0 c m	30 粒程度	500 g
ロザリオビアンコ	満開時 7.0 c m	35 粒程度	400 g
サニールージュ	満開時 6.0 c m	40 粒程度	300 g

※重要※ 黒とう病に注意してください。

大発生した年から 2 年たちましたが、本年も発生リスクがあります。降雨後 3～5 日したら新梢を中心に病斑がないか確認をしてください。

- ① 症状の確認 ⇒ 右写真参照
- ② 防除の実施 ⇒ 未防除園で発生が確認
- ③ 草刈りの実施 ⇒ 下草からの伝染があります
- ④ 昨年発生した場所の確認 ⇒ 昨年の病斑が伝染源
- ⑤ 被害枝葉の確認 ⇒ 被害枝葉を園地外へ持ち出す

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。

