



1. 気象概況（中野市長丘地区気象ロボット観測データによる）

旬別 月間	上旬		中旬		下旬		月間		コメント
	本年	平年	本年	平年	本年	平年	本年	平年	
平均気温（℃）	12.9	14.0	17.3	15.6	17.8	17.5	16.0	15.7	月間平年比+0.3℃(高)
降水量（mm）	16.5	18.2	10.5	18.9	42.0	25.2	69.0	62.3	月間平年比 111%（多）
日照量（h）	88.3	70.8	97.0	75.8	95.3	75.9	280.0	222.5	月間平年比 126%（多）

● 5 月気象特記 *最高℃（5/27）33.2℃ 夏日 17 最低-1.3℃（5/8）強風 16.5m/s（5/6）降雨 35.0 mm（5/21）

参考（4 月）：平均気温－0.8℃（低）・降水量平年比 82%（少）・日照量平年比 96%（並）・強風 14.9m/s（4/15）・最高 4/23 29.0℃

- 上旬（平年比）：気温（低）-1.1℃、降水量 91%（少）、日照量 124%（多）

■ 中旬（平年比）：気温（高）+1.7℃、降水量 56%（少）、日照量 128%（多）

■ 下旬（平年比）：気温（高）+0.3℃、降水量 167%（多）、日照量 126%（多）
- ◆ 降霜：4/28 -1.6℃ 5/8 -1.3℃

2. 生産の経過・病虫害発生状況・今後の対策

ハウス

① ぶどう：パープル（継続）、シャイン（継続）出荷中。引き続き有核巨峰出荷開始予定。

② サクランボ：35 棟。出荷最盛期は 5 月中旬。高温によるウルミ果、降雨による裂果が散見される。最終出荷量見込 12t

③ もも：1 棟。初出荷 5/1。

生産特記

① 生産基盤（推定）：ぶどう 350ha・りんご 150ha・もも 88ha・和梨 15ha・西洋梨 7ha・桜桃 11ha

② 凍害（枯死）：もも等で発生中。発生程度は昨年より少ない模様。

③ 野そ被害：3 月初旬から被害が目立った ⇒ 苗木の食害等の被害程度は大

④ 露地ぶどう：巨峰 展葉 8～10 枚頃 シャイン 展葉 5～8 枚頃 園地・樹によりバラつきあり。目立つ病虫害の発生は無いが、一部カスミカメムシ被害あり。種無しぶどうのストマイ剤散布の徹底指導。房切講習会実施中。

⑤ 果樹類全体に 4 月の低温で生育停滞が顕著であった。生育はほぼ平年並みで経過。

⑥ 満開：プラム 4/20（確定） もも 4/24（確定） なし 4/30（確定） ふじ 5/4（確定） *昨年比+7 程度。H29（平年）並み。

⑦ 総括：発芽後の停滞期間が過去に長かった。4/15 以降の気温上昇で生育進。開花期は H29（平年）並みで経過。

⑧ 収穫開始：佐藤錦 6/15、大石 6/30、白鳳系 8/3、あかつき 8/8、なつっこ 8/12、太陽 8/15、川中島 8/25、南水 9/20、ラフ 9/27 *昨年比+7

⑨ 露地サクランボ：高砂中心に花器異常散見。着果量への影響あり。特に開花期の早い園地・品種、下枝に被害多い。

⑩ ふじの花量少（花の状態は良好） ⇒ 開花前の低温遭遇や乾燥等により不受精果多い。人工授粉実施の中心果の肥大良好。

⑪ 結実状況：プラム⇒前年並 もも⇒良好（川中島は一部不良） 南水⇒不良 露地桜桃⇒一部不良 ふじ⇒やや不良～不良

⑫ 結実率：ふじ平均 60.8%（やや不良） 南水 55%（不良） *JA 調査

⑬ ぶどう開花予想：巨峰（南部）6/3、巨峰（北部）6/7、シャイン M（南部）6/11、シャイン M（北部）6/15 *昨年比+5

⑭ 柿開花予想 6/5 前後・キウイ開花予想 F6/1～3 頃 *昨年比+7

⑮ 降霜被害（4/28・5/8）：りんご秋映等のツルサビ発生 南水結実不良 ⇒ 減収の一因

病虫害

① 腐らん病対策：全域で被害大。病斑部の削り取りを進め梅雨期間の感染拡大防止対策を早急に講じる。

② 黒星病対策：5/8～12 ユニックス+オンリーワン F ⇒ 5/18～22 フルーツセイバー+コルト ⇒ 5/25～31 ジマンダイセン

③ 黒星病飛散状況：4/30 一次感染。5/31 現在、一部で葉病斑発生。果実感染なし。発生程度は昨年より少ない見込み。

④ うどんこ病対策：芽しぶ（被害枝）発生遅い。被害は昨年より少ない。

⑤ せん孔細菌病対策：開花期から枝病斑が発生。5 月中旬～、多発園地中心に葉病斑を確認。

⑥ 黒とう病対策他：予防散布徹底。展葉 2～3 枚目 オンリーワン F+ダイアジノン ⇒ 展葉 6 枚目頃 オーソサイド

⑦ 主要害虫：越冬世代の発生は全体に遅い。大型連休後にアブラムシ類の発生あり。

⑧ りんご薬剤摘果：ふじ満開 14 日後目安 ⇒ 5/20～25 頃。ミクロデナポン水和剤 1,200 倍+機能性展着剤（ニーズ等）

⑨ ぶどうストマイ液剤散布：南部 5/23～・北部 5/25～。満開予定の 14 日前から散布可能。散布遅れに注意する。

2019 果樹類生育状況調査表				
りんご	ふじ(平岡)			
年度	発芽	開花	満開	エゾノコリンゴ発芽
H29	4/7	5/1	5/5	2/20
H30	3/29	4/21	4/24	2/14
2019	4/1	4/30	5/3	2/19
前年差	3	9	9	5
もも	白鳳(平岡)			
年度	発芽	開花	満開	収穫開始
H29	4/7	4/19	4/24	8/3～
H30	3/29	4/12	4/17	7/25～
2019	3/31	4/20	4/24	8/3～？
前年差	2	8	7	
和梨	南水(田麦)			
年度	発芽	開花	満開	収穫開始
H29	4/10	4/26	4/30	9/20～
H30	3/29	4/18	4/20	9/15～
2019	4/7	4/26	4/30	9/20～
前年差	9	8	10	
西洋梨	フランス(田麦)			
年度	発芽	開花	満開	収穫開始
H29	4/9	4/26	4/30	9/25～
H30	3/29	4/19	4/21	9/18～
2019	4/7	4/26	4/30	9/25～
前年差	9	7	9	
サクランボ	佐藤錦			
年度	発芽	開花	満開	収穫開始
H29	4/7	4/22	4/26	
H30	4/1	4/14	4/19	6/1
2019	4/6	4/23	4/26	6/5～
前年差	5	9	7	
ぶどう	巨峰(平岡)			
年度	発芽	開花	満開	水あがり
H29	4/28	6/9	6/17	3/20
H30	4/21	6/2	6/6	3/19
2019	4/28	6/8?	6/11?	3/22
前年差	7	6	5	1/3