



第12回【ぶどう定期防除】(べと病、チャバロアザミ等)

散布時期	袋かけ直後の防除から10日後(7月中旬~7月下旬)				
散布品種	全品種				
散布薬剤	水		100	ℓ	散布日 月 日
	ICボルドー66D	—	2.5	kg	
	テルスター水和剤	(14日前、1回)	100	g	
	ビッグマグ	葉色向上	100	g	葉面散布剤です。
シャインマスカット	ICボルドー66Dに代えて ムッシュボルドーDF				
散布量	400ℓ/10a				
注意点	※テルスター水和剤の加用は散布直前の混用とする。スリップス(クモ、やぶ蚊)発生園 ① ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー、コサイド3000 2,000倍、ムッシュボルドーDF500倍を使用してもよい。(コサイド、ムッシュ使用時薬害心配な園はクワアザミを加用する。) ② ボルドー液散布の際は、近隣園に飛散しないよう注意する。(汚れ・もも・プラム等への薬害) ③ シャインマスカット園でハダニ類の発生がある場合はコロマイト水和剤2,000倍(7日前、2回)を直前混用して散布する。(※コロマイト乳剤は登録外なので間違えないように注意する)				

【※4-4式ボルドーの作り方 (水100ℓに対し硫酸銅400g、生石灰400g)】

- ① 生石灰に生石灰の3倍重量の水を混ぜ消化させ、温度が下がるまで放置する。(火傷、火事注意)
- ② 消化した石灰に全水量の1~2割(10~20ℓ)の水を加え、石灰乳とする。
- ③ 硫酸銅をバケツ1杯程度のぬるま湯でよく溶かし、残りの全水量(80~90ℓ)に溶かす。
- ④ ②の石灰乳に③の硫酸銅液を攪拌しながら徐々に加えて100ℓにする。

第13回【ぶどう定期防除】(べと病、さび病防除)

散布時期	前回から10日後(7月下旬~8月上旬)				
散布品種	全品種				
散布薬剤	水		100	ℓ	散布日 月 日
	ICボルドー66D	—	2.5	kg	
	ビッグマグ	葉色向上	100	g	葉面散布剤です。
散布量	400ℓ/10a				
注意点	① ICボルドー66Dに代えて4-4式ボルドー、コサイド3000 2,000倍、ムッシュボルドーDF500倍を使用してもよい。(コサイド、ムッシュ使用時薬害心配な園はクワアザミを加用する。) ② コサイド・ムッシュボルドー使用時は展着剤を加用する。(KKステッカーやアピオンE等) ③ ボルドー液散布の際は、近隣園に飛散しないよう注意する。(汚れ・もも・プラム等への薬害)				

◆農薬収穫前規制について◆

収穫を控え使用できる農薬が限られてきます。下記を参考に農薬の安全使用に努めて下さい。

農薬名	対象病虫害	使用倍率	収穫前日数	使用可能回数
エトフィンフロアブル	べと病	1,000倍	収穫7日前まで	4回
イカズチWDG	アザミ類・カサシ類・アザミ類	1,500倍	収穫7日前まで	5回まで
アピオンフロアブル	チャバロアザミ(スリップス)・カサシ類・アザミ類	1,500倍	収穫7日前まで	5回まで

散布できる農薬が限られてきています。ご不明な点はぶどう担当までご相談下さい。

次回特報は8月2日頃配布予定です