

7/9 時点で、園地によってはハダニ類の発生が確認されています。7/1 発行の「もも・ネクタリン特報No.⑧」の薬剤散布（散布目安は、7/16～22 頃）を徹底し、ハダニ類の発生抑制に努めて下さい。

**\*なつっこ等、中生種 最終防除（有袋栽培の場合は、除袋後に散布する）**

## もも

### 第10回 定期散布

**散布時期** 8月上旬（第9回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：8月1日～7日

散布日 8月 日

**散布薬剤** 水 100ℓ当り

散布量 リットル

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

アーデントフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

**散布量** 10アール当り 600ℓ

**混用順** 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートF ⇒ アーデントF

**対象病害虫** 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類、アザミウマ類

## ネクタリン

### 第10回 定期散布

**散布時期** 8月上旬（第9回目の定期散布から14日後）

・散布日の目安：8月1日～7日

散布日 8月 日

**散布薬剤** 水 100ℓ当り

散布量 リットル

展着剤（ハイテンパワー） 10ml

ベルコートフロアブル 50ml（収穫前日まで、2回以内）

アーデントフロアブル 50ml（収穫前日まで、3回以内）

**散布量** 10アール当り 600ℓ


**混用順** 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルコートF ⇒ アーデントF

**対象病害虫** 黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病、シンクイムシ類、カメムシ類

## ◆せん孔細菌病の夏型枝病斑を切除しましょう！

せん孔細菌病の発生園では、すでに夏型枝病斑が確認されています。  
枝病斑は見つけ次第切除し、園内の菌密度を下げてください。

夏型枝病斑・・・新梢に発生。紫黒色。




日照不足が続いています。(6月の日照量：平年比 65%) 果実品質、特に糖度への悪影響が心配されます。

徒長枝の整理を行ない、結果枝への日当たりを良くするとともに、樹冠下の明るさを確保して下さい。



樹冠下が暗い場合



徒長枝を整理し、樹冠下の明るさを確保(相対照度 30%)

## ◆収穫開始予想 (7/11 現在)

直前の気象条件により前後します。下表を参考に、果実の状況を見て収穫期を判断して下さい。

品種名	南部地区	平岡地区
白鳳	8 / 1 ~	8 / 2 ~
あかつき	8 / 2 ~	8 / 4 ~
なつっこ	8 / 10 ~	8 / 12 ~
川中島白桃	8 / 22 ~	8 / 24 ~
黄金桃	8 / 25 ~	8 / 27 ~

熟度優先の収穫に努めて下さい。成熟は昨年より 5~7 日程度遅い状況ですが、**除袋・反射マルチ・葉摘み等**の管理作業は、早めに進めて下さい。反射マルチは、「タイベック」等を使用して下さい。

## ◆除袋終了目安 (平岡地区)

\***収穫予想日の 14 日前頃**から試し除袋を行ない、地色の抜け具合を確認してから除袋を進めて下さい。

\***二重袋を使用している場合は**、成熟が進む傾向がありますので、目安よりも **2~3 日早めに除袋**を実施して下さい。

## ◆果実腐敗防止対策 降雨が続く病害が心配される場合は殺菌剤の特別散布を実施して下さい。(下表)

灰星病の耐性菌出現を回避するため、同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール生合成阻害剤 (DMI)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで (3回)	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール 1000 は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
		オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 2000倍	収穫前日まで (3回) 収穫前日まで (3回)	
	その他	ベルコートフロアブル ダコニール 1000	2000倍 1000倍	収穫前日まで (3回) 収穫前日まで (6回)	
ネクタリン	エルゴステロール生合成阻害剤 (DMI)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで (2回)	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール 1000 は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
		オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 2000倍	収穫前日まで (3回) 収穫前日まで (3回)	
	その他	ベルコートフロアブル ダコニール 1000	2000倍 1000倍	収穫前日まで (2回) 収穫前日まで (2回)	