



もも・ネクタリン特報

No.8 H26. 7.25
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

主要品種の成熟期が近づいてきております。除袋や葉摘みを主体とした着色管理は、遅れないように早めに進めましょう。病害虫では梅雨明け以降、ハダニ類・灰星病・モモハモグリガ・シンクイムシ類・ミカンキイロアザミウマなどの重要防除期となります。薬剤散布は散布ムラのないよう、ていねいに行なってください。

もも

第10回 定期防除

7月末～8月上旬の散布

○収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください

散布時期：7月31日～8月7日（前回散布から15日後）

散布薬剤：（混用順）

水	100㍓
展着剤	20ml
ベルコートフロアブル	50ml（前日、3回）
アーデント水和剤	100g（前日、3回）

適用病害虫：灰星病・黒星病・ホモプシス腐敗病
モモハモグリガ・シンクイムシ類・カメムシ類
ドウガネブイブイ、アザミウマ類

散布量：10アールあたり 600㍓

【注意事項】

- ① 除袋期に入った品種は、除袋後着色始めに散布する。
- ② ハダニ類の発生園は、コロマイト乳剤 1000 倍（収穫7日前、1回）を加用する。
*ただし、収穫前規制に注意する
- ③ モモハモグリガの発生園は、ノーモルト乳剤 2000 倍（前日、2回）を加用する。

散布日	月	日
散布量		㍓

ネクタリン

第10回 定期防除

7月末～8月上旬の散布

○収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください

散布時期：7月31日～8月7日（前回散布から15日後）

散布薬剤：（混用順）

水	100㍓
展着剤	20ml
ベルコートフロアブル	50ml（前日、2回）
アーデント水和剤	100g（前日、3回）

適用病害虫：灰星病・黒星病・ホモプシス腐敗病
モモハモグリガ・シンクイムシ類・カメムシ類
アザミウマ類

散布量：10アールあたり 600㍓

【注意事項】

- ① ハダニ類の発生園は、コロマイト乳剤 1,000 倍（収穫7日前、1回）を加用する。
*ただし、収穫前規制に注意する
- ② モモハモグリガの発生園は、ノーモルト乳剤 2000 倍（前日、2回）を加用する。

散布日	月	日
散布量		㍓

農薬（毒物・劇物）をお買い求めの際は、印鑑をご持参ください。

裏面もご覧ください

未熟・過熟果に注意し各園地で適熟期に入ったものから順次収穫してください。また、今後の品種の成熟予想は前年より 2 日程度早いと予想されます。除袋を中心とした着色管理や、諸栽培管理が遅れないように注意すると共に、果実腐敗病対策には万全を期してください。

1. H26 収穫始め予想と過去 3 年間の収穫開始期（平岡地区）

直前の気象条件により前後します。下表を参考に、果実の状況を見て適期を判断しましょう

品種名	平成 26 年	平成 25 年	平成 24 年	平成 23 年
白鳳(在来系)	8／1	8/3	8/6	8/6
優良系白鳳	8／1	8/2	8/5	8/6
選抜あかつき	8／3	8/5	8/7	8/8
山根白桃	8／1 4	8/15	8/18	8/20
なつっこ	8／1 3	8/14	8/16	8/18
川中島白桃	8／2 4	8/25	8/29	8/27
黄金桃	8／2 6	8/28	8/30	8/30
晶光(ネクタリン)	8／6	8/8	8/10	8/11

2. 除袋目安・・・平岡地区を基準としています。

＊あくまで目安ですので、園地状況を確認し、試し除袋してから作業に入りましょう。

品種	除袋 目安	
あかつき、なつっこ	収穫 8～10 日前	あかつきは早急に除袋。なつっこ 8/5 頃までに。
山根白桃、志賀白桃、白桃	収穫 12～14 日前	8/2 頃～。
川中島白桃、黄金桃	収穫 8～10 日前	川中島白桃 8/15 頃までに。 黄金桃 8/16 頃までに。

3. 果実腐敗防止対策 雨が続く場合、系統の違う剤を輪番で使用する。（下表）

灰星病の耐性菌出現を回避するため同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

もも	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（4回） 収穫前日まで（3回）	
	そ の 他	ロブラール水和剤 ベルクートフロアブル ダコニール1000	1500倍 2000倍 1000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（6回）	
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤（E B I）	スコア顆粒水和剤 アンビルフロアブル オーシャインフロアブル インダーフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 1000倍 2000倍 5000倍 2000倍	収穫前日まで(2回) 収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(4回) 収穫前日まで(3回)	1．ベルクート剤は、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2．ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。
	そ の 他	ロブラール水和剤 ベルクートフロアブル ダコニール1000	1500倍 2000倍 1000倍	収穫前日まで(3回) 収穫前日まで(2回) 収穫前日まで(2回)	