



ナン特報・西洋梨 No.6

令和元年7月17日
JA中野市営農センター
JA中野市ナン部会

6/7 梅雨入り後は低日照・多雨・多湿が続いています。徒長枝などの整理を行い、園地内に十分光が入るようにしてください。また収穫まで一定の間隔で散布を進めてください。

◆ **西洋梨**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【有袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月25日～30日 *左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml スターマイトフロアブル 50ml (前日、1回) キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) 劇 オリオン水和剤40 100g (3日前、2回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類	
散布量	10a 当り：600ℓ以上	
注意事項	① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフロアブル 2,000倍（前日、1回）でもよい。 ② オリオン水和剤40は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【有袋】8月中旬の薬剤散布（前回より20日後）

散布時期	8月15日～20日 *左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ベルクートフロアブル 50ml (14日前、5回) 劇 イカズチ WDG 66g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類	
散布量	10a 当り：600ℓ以上	
注意事項	① オーロラ等の最終散布。 ② ハダニ類対策 ：コロマイト乳剤の1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③ イカズチ WDGは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

◆ 7月中下旬の重点作業

① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）

梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 可樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。

② 雑草管理：害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底してください。

除草剤使用基準：バスタ液剤（水100ℓ 当り バスタ液剤500ml）

西洋梨（無袋）の薬剤散布は次ページをご覧ください

西洋梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】7月中旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月20日前後	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ベルコートフロアブル 50ml (14日前、5回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10アール当り：600ℓ以上	
注意事項	① ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。	

【無袋】7月末の薬剤散布（前回から10日後）

散布時期	7月30日前後	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml スターマイトフロアブル 50ml (前日、1回) キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) 劇オリオン水和剤40 100g (3日前、2回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ハダニ類	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① スターマイトフロアブルに代えて、ダニコングフロアブル2,000倍（前日、1回）でもよい。 ② オリオン水和剤40は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【無袋】8月中旬の薬剤散布（前回から15日後）

散布時期	8月15日前後	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ベルコートフロアブル 50ml (14日前、5回) 劇バリアード顆粒水和剤 50g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ② バリアード顆粒水和は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

次回特報 発行予定日：8月19日
8月末、9月中旬（最終）の薬剤散布について