



No.6

◆ **和梨（有袋）** の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

◆ 散布日：7月 日

◆ 散布量： リットル

【有袋】 8 月上中旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

◆ 散布日：8月 日

◆ 散布量： リットル

和梨（無袋）の薬剤散布は次ページをご覧ください

和梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月25日～30日 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 20ml ダニコングフロアブル 50ml（前日、1回） キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回） 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、カメムシ類、クワコナカイガラムシ	
散布量	10アール当り：450ℓ以上	
注意事項	① 通常展着剤（ハイテンパワー）に代えて、ササラ2,000倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。 ② バリアード顆粒水和は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【無袋】8月上中旬の防除（前回から15日後）

散布時期	8月10日～15日 *左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 20ml コロマイト乳剤 100ml（前日、1回） ベルコートフロアブル 50ml（14日前、9回） エクシレルSE 20ml（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① 幸水等の最終散布 ② ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。	

- ◆ 7月中下旬の重点作業
- ① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）
- 梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 可樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。
⇒ 定期的に冠水を行う。
- ② 雑草管理：害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底してください。
- 除草剤使用基準：バスタ液剤（水100ℓ 当り バスタ液剤500ml）

次回特報 発行予定日：8月19日

8月下旬、9月上中旬（最終）の薬剤散布について