

いもち病防除にはコレ！！

1. **発生していない場合** 使用時期は7月30日までにできるだけ早く。

- ・ コラトップジャンボP・・・10a当たり 10～13 パック投げ込む。

※水を張った状態で使用する。拡散をよくするため水深を5 cm以上確保する。
散布後は3日間湛水状態を保つ。

- ・ コラトップ粒剤5・・・10a当たり3～4kg散布。

※水を張った状態で使用する。散布後は3日間湛水状態を保つ。

- ・ ブラシン粉剤DL・・・10a当たり3～4kg散布。

※粉剤なので、吸い込まないようにマスク等を使用すること。

2. **既に葉に発生している場合** 使用時期は7月30日までに、できるだけ早く。

- ・ ブラシン粉剤DL・・・10a当たり3～4kg散布。

※粉剤なので、吸い込まないようにマスク等を使用すること。

- ・ オリブライト1キロ粒剤・・・10a当たり1 kg散布。

3. **既に葉に発生していて 使用時期が8月になる場合**

- ・ カスミン液剤・・・1000倍に希釈し動噴等で散布する。

- ・ ブラシン粉剤DL・・・10a当たり3～4kg散布。

※粉剤なので、吸い込まないようにマスク等を使用すること。

いもち病は穂に発生してしまうと、手遅れです。手遅れとならないよう気を付けましょう。