



# もも・ネクタリン特報

No.9 H26. 8.8  
J A 中野市営農センター  
J A 中野市りんご・もも部会

早生種の収穫がピークを迎えております。園地・樹勢によって成熟期に差がありますので、熟度優先で収穫適期を迎えた果実は直ちに収穫を行ない、過熟にならないよう注意してください。尚、除袋、反射マルチ等、着色管理は遅れないよう早めに進めましょう。

また、降雨による腐敗性病害（灰星病など）、高温による害虫の多発が心配されます。定期散布を徹底し、病虫害発生状況によっては特別散布を実施しましょう。

もも

## 第11回 定期防除

8月中下旬の散布

散布日	月	日
散布量		リットル

○収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください

散布時期：8月15日～22日（前回散布から15日後）

散布薬剤：（混用順）

水	100 リットル
展着剤	20ml
オーシャインフロアブル	50ml（前日、3回）
④コテツフロアブル	50ml（前日、2回）

適用病虫害：灰星病・黒星病・ホモプシス腐敗病

ミカンキイロアザミウマ、モモハモグリガ  
ナミハダニ

散布量：10アールあたり 600 リットル

### 【注意事項】

- ① 除袋期に入った品種は除袋後着色始めに散布する。
- ② モモハモグリガの発生園は、サムコルフロアブル10の5,000倍（前日、2回）、または、ダイアジノン水和剤34の1,000倍（前日、4回）を加用する。

ネクタリン

## 第11回 定期防除

8月中下旬の散布

散布日	月	日
散布量		リットル

○収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください

散布時期：8月15日～22日（前回散布から15日後）

散布薬剤：（混用順）

水	100 リットル
展着剤	20ml
オーシャインフロアブル	50ml（前日、3回）
アルバリン顆粒水溶剤	50g（前日、3回）

適用病虫害：灰星病・黒星病・ホモプシス腐敗病

モモハモグリガ・シンクイムシ類・カメムシ類

散布量：10アールあたり 600 リットル

### 【注意事項】

- ① ミカンキイロアザミウマの発生園は、アルバリン顆粒水溶剤に代えて、スピノエースフロアブル4,000倍（**収穫3日前**、2回）を散布する。  
\*ただし、収穫前規制に注意する。

農薬（毒物・劇物）をお買い求めの際は、印鑑をご持参ください。

裏面もご覧ください

## 1. 除袋について

\*熟度の進み具合に注意し早めの着色管理を実施しましょう。

品 種	除袋時期	除袋 目安	
		南部	北部
川中島白桃	収穫 7～10 日前	8/13 までに	8/15 までに
黄金桃	収穫 8～10 日前	8/14 までに	8/16 までに

## 2. 新梢管理について

樹冠内部や主枝・亜主枝の背面から発生した旺盛な徒長枝は、成葉 4～5 枚残して摘芯する。

樹勢が弱い樹は過度に摘芯するとさらに樹勢低下を招くので、できるだけ新梢は切らない。

## 3. かん水について

晩生種は必要により灌水を行う。

収穫 7 日前には、灌水を止める。(食味重視のため)

## 4. 反射マルチの利用

**高温による果肉障害(軟化)対策として白色マルチ(タイベック・パールライトS)を活用しましょう!**

★大部分の果実は下を向いています。樹下から太陽光線をあて着色向上を!!

白色マルチ「タイベック」「パールライトS」を使用すると、着色向上と成熟の極端な進みを回避できます。

【使用時期】・着色のしやすい品種=収穫 5～7 日前      ・着色しにくい品種=収穫始めの 10～14 日前

## 5. 果実腐敗防止対策 雨が続く場合、系統の違う剤を輪番で使用する。(下表)

灰星病の耐性菌出現を回避するため同一系統の薬剤を連用せず、異なる系統の薬剤をローテーション散布する。

	薬剤の系統	薬剤名	使用倍率	適正使用基準
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤 (E B I)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで (3回)
		アンビルフロアブル	1000倍	収穫前日まで (3回)
オーシャインフロアブル		2000倍	収穫前日まで (3回)	
インダーフロアブル		5000倍	収穫前日まで (4回)	
オンリーワンフロアブル		2000倍	収穫前日まで (3回)	
その他	その他	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日まで (3回)
		ベルコートフロアブル	2000倍	収穫前日まで (3回)
		ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで (6回)
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤 (E B I)	スコア顆粒水和剤	2000倍	収穫前日まで (2回)
		アンビルフロアブル	1000倍	収穫前日まで (3回)
		オーシャインフロアブル	2000倍	収穫前日まで (3回)
		インダーフロアブル	5000倍	収穫前日まで (4回)
		オンリーワンフロアブル	2000倍	収穫前日まで (3回)
その他	その他	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日まで (3回)
		ベルコートフロアブル	2000倍	収穫前日まで (2回)
		ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで (2回)

### 注意事項

- ベルコート剤は、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。
- ダコニール 1000、ダコレート水和剤は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合がありますので注意する。