



ナン特報・和梨

令和元年 8 月 19 日
J A 中野市営農センター
J A 中野市ナン部会

No.7

7 月の園地点検お疲れ様でした。今後の作業として引き続き定期的な防除と徒長枝整理を行い園地内に十分日光が当たるようにしてください。また、収穫まで高温干ばつが予想されるため十分な灌水を行ってください。

今回の特報は、**有袋・無袋**共通です。

【和梨】8 月下旬の薬剤散布（前回より 10～15 日後）

散布時期	8 月 25 日～30 日 *左記は目安となります	◆ 散布日：8 月 日 ◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤 2 0 ml ナリア WDG 5 0 g （前日、3 回） 劇イカズチ WDG 6 6 g （前日、3 回）	
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、（ハダニ類）	
散布量	10 a 当り：450 リットル以上	
注意事項	① 豊水等の最終散布。 ② ナリア WDG は、ピオーネ・サニールージュに薬害を生じる恐れがあるので飛散しないようにする。 ③ イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。 ④ ハダニ類対策 ：カネマイトフロアブル 1,000 倍（前日、1 回）を加用する。	

【和梨】9 月上中旬の薬剤散布（前回より 15 日後）

散布時期	9 月 10 日～15 日 *左記は目安となります	◆ 散布日：9 月 日 ◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水 1 0 0 リットル 展着剤 2 0 ml ストロビードライフフロアブル 5 0 g （前日、3 回） ダントツ水溶剤 5 0 g （前日、3 回）	
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、コナカイガラムシ類（ハダニ類）	
散布量	10 a 当り：450 リットル以上	
注意事項	① 南水・あきづき等の最終散布。 ② ハダニ類対策 ：アカリタッチ乳剤 1,000 倍（前日、一）を使用する。混用は展着剤の次とする	

和梨重点栽培管理・収穫については次ページをご覧ください

～ 和梨重点栽培管理・各種収穫について ～

◆ 無袋栽培の防鳥・防蛾対策

- ① 幸水等で鳥害が多発しています。芳香の強い南水は鳥害を受けやすいので注意してください。
- ② 防鳥ネットの点検。（破損箇所がないようにしましょう。）

◆ 日焼け果（石梨）の除去は収穫前に！

梅雨明け後から無袋の上向き果を中心に日焼け果が発生しています。この日焼け果を放置しておくと、収穫時には果面が浅黒く、果肉が硬い果実（石梨）になります。この石梨は食味が悪いため、正品及び袋詰め規格にも入りません。収穫前に除去してください。

◆ 南水の適期収穫について *9月残暑により成熟が一気に進む可能性があります！過熟発生にご注意ください。

- ① 満開後 145 日前後、南水用カラーチャート値 2.3 の果実を中心に収穫できるようにする。

果皮色は、ていあ部（尻）からこうあ部（軸）に向かって進む。よって、カラーチャートの比色部位は果実の赤道面のやや下側の陰光面とする

【カラーチャート指数 2.3】・・・緑色が抜け始め、ていあ部から赤道部にかけて褐色部が 30％位
- ② 収穫開始予想：南部地区 9 月 17 日頃～、北部地区 9 月 20 日頃～ *樹勢や土質によっても前後します。
- ③ 収穫直前の高温により成熟が早まる傾向にあります。外観や食味等総合的に判断して収穫作業に入りましょう。
- ④ 中長期的な販売が可能な果実品質の収穫を徹底してください。また果面が赤茶色状まで進んだ果実は、即売向きと判断し、別コンテナでの集荷を予定しています。

目揃会開催について

	期日	時間	場所
幸水	8 月 26 日（月）	11：00	平岡共選所
豊水	9 月 6 日（金）	11：00	平岡共選所

収穫開始見込み

幸水：南部 8/25～、北部 8/30～
豊水：南部 9/5～、北部 9/10～
あきづき：南部 9/12 頃～、北部 9/15 頃～
南水：南部 9/17 頃～、北部 9/20 頃～

※目揃会に参加できない方は、各共選所に資料をご用意いたしますので、各自お持ちください。