



ナン特報・西洋梨 No.7

令和元年 8月 19日
J A中野市営農センター
J A中野市ナン部会

7月の園地点検お疲れ様でした。今後の作業として、引き続き定期的な防除と徒長枝整理を行い園地内に十分日光が当たるようにしてください。また、収穫まで高温干ばつが予想されるため十分な灌水を行ってください。

◆ **西洋梨（有袋）**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【有袋】9月上中旬の薬剤散布（前回より 20 日後）

散布時期	9月5日～10日 *左記は目安となります	◆ 散布日：9月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ストロビードライフフロアブル 50g (前日、3回) ダントツ水溶剤 50g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類	
散布量	10a 当り：600ℓ以上	
注意事項	① ラ・フランス、バラード等の最終散布。 ② ストロビードライフフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤 1,000 倍（3 日前、9 回）でもよい。	

目揃会開催について

	期日	時間	場所
オーロラ	8月23日（金）	11：00～	南部共選所
M・マリーラ		14：00～	長丘研修センター

【重要】収穫期間見込み ※昨年より約7日遅れの見込みです

オーロラ：8/24 ～ 9/5 頃
Mマリーラ：9/1 ～ 9/10 頃
バラード：9/15 ～ 9/25 頃
ラ・フランス：9/27 ～ 10/6 頃

※目揃会に参加ができない方は、各共選所に目揃会資料をご用意致しますので、各自お持ちください。

西洋梨（無袋）の薬剤散布は次ページをご覧ください

西洋梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】8月下旬の薬剤散布（前回より10～15日後）

散布時期	8月25～30日 ※左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) 劇イカズチWDG 66g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、(ハダニ類)	
散布量	10アール当り：600ℓ以上	
注意事項	① オーロラ等の最終散布。 ② ハダニ類対策 ：コロマイト乳剤1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③ イカズチWDGは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【無袋】9月中旬の薬剤散布（前回から10～15日後）

散布時期	9月10～15日 ※左記は目安となります	◆ 散布日：9月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ベルクートフロアブル 50ml (14日前、5回) ダントツ水溶剤 50g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類、ケムシ類、コナカイガラムシ類	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① バラード等の最終散布。 ② ベルクートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。 ③ ベルクートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。	

【無袋】9月下旬の薬剤散布（前回から10日後）

散布時期	9月20～25日 ※左記は目安となります	◆ 散布日：9月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ストロビードライフロアブル 50g (前日、3回)	◆ 散布量： ℓ
対象病害虫	輪紋病	
散布量	10アール当り：600ℓ	
注意事項	① ラ・フランス、シルバーベル等の最終散布。	