

もも・ネクタリン特報



No.

⑪

2019. 8. 19

J A 中野市営農センター

J A 中野市りんご・もも部会

- ・晩生種以降の収穫期は、平年並みかやや遅れると予想されます。(収穫予想は、りんごもも部会特報 No.7 参照)
- ・枝折れが散見されます。再度、支柱立てを見直して下さい。

- *もも極晩生種（白根白桃、幸茜、さくら、黄貴妃等）、ネクタリン秀峰、最終防除
- *有袋栽培で除袋が間近な場合は、除袋後に散布する

も も

第12回 定期散布

散布時期 8月末～9月上旬 (第11回目の定期散布から14日後)

・散布日の目安: 8月29日～9月4日

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤 (ハイテンパワー) 10ml

ベルクトフロアブル 50ml (収穫前日まで、3回以内)

散布量 10アール当り 600ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルクトF

対象病害虫 灰星病、黒星病、ホモプシス腐敗病

散布日 月 日

散布量 ℓ

*シンクイムシ類・ミカンキイロアザミウマの発生園、その他害虫の発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍(前日、3回)を加用する。

ネクタリン

第12回 定期散布

散布時期 8月末～9月上旬 (第11回目の定期散布から14日後)

・散布日の目安: 8月29日～9月4日

散布薬剤 水 100ℓ当り

展着剤 (ハイテンパワー) 10ml

ベルクトフロアブル 50ml (収穫前日まで、2回以内)

散布量 10アール当り 600ℓ

混用順 水 ⇒ 展着剤 ⇒ ベルクトF

対象病害虫 黒星病、灰星病、ホモプシス腐敗病

散布日 月 日

散布量 ℓ

*シンクイムシ類・ミカンキイロアザミウマの発生園、その他害虫の発生が心配される場合は、アーデントフロアブルの2,000倍(前日、3回)を加用する。

次ページに今後の収穫予想、ファンタジア目揃会のお知らせを掲載しています。ご確認ください。

1．収穫開始予想（8/7 時点）

直前の気象条件により前後しますが、下表を参考に、果実の状況を見て収穫適期を判断して下さい。

- *晩生種以降は収穫前に猛暑が続くと成熟が遅れる傾向があります。
- *樹勢が弱い場合は熟期が早まり、樹勢が強い場合は熟期が遅れます。

	品種名	南部地区	平岡地区
もも	川中島白桃	8／23～	8／24～
	黄金桃	8／26～	8／27～
	幸茜	9／9～	9／10～
	さくら白桃	9／14～	9／15～
	黄貴妃（無着色）	9／7～	9／8～
ネクタリン	ファンタジア	8／26～	8／28～

2．除袋目安

*収穫予想の14日前頃に試し除袋を行い、果実の地色の抜け具合を確認した後、除袋をすすめて下さい。

ネクタリン「ファンタジア」栽培者の皆様へのお知らせ

ファンタジア 出荷目揃会の開催について

標記の件につきまして、下記のとおり目揃会を開催しますので、出荷者全員のご出席をお願いします。

●日時・場所 *いずれかの会場へ出席をお願いします。

期 日	時 間	場 所
8月23日（金）	11：30～	南部 共選所
8月27日（火）	14：00～	平岡 共選所