



もも・ネクタリン特報

No.11 H26. 8.29
J A 中野市営農センター
J A 中野市りんご・もも部会

本年は市内全域でせん孔細菌病の発生が確認されており、次年度への越冬菌密度も高くなる恐れがあります。9月上中旬から越冬菌が感染する時期となりますので、ボルドー液の散布は必ず実施しましょう。なお、極晩生種は収穫終了後に2回散布してください。

【せん孔細菌病対策 ボルドー液 散布日目安】 *発生園は、必ず散布しましょう。

9月上中旬～10月上旬に3回。 散布間隔は14日以内を厳守してください。

散布時期	第1回 ボルドー散布	第2回 ボルドー散布	第3回 ボルドー散布
散布品種			
早生種～中生種、 晩生種(川白、黄金桃など)	9月10日頃	9月20日～24日頃	10月3～8日頃
極晩生種(白根白桃など)	収穫終了後、直ちに	第1回散布から 10～14日後頃	

○隣接する園地（ぶどうやりんご、除袋後の桃など）に薬液が飛散しないよう十分注意する。

もも

◎収穫終了後の散布（1回目のみスミチオン乳剤を混用する）

散布時期：9月上中旬～（収穫終了後）	
散布薬剤：	水 100ℓ
	4-12式ボルドー液
	生石灰 1200g
	硫酸銅 400g
	スミチオン乳剤（3日前、6回） 100ml
	KKステッカー（固着性展着剤） 33ml
*KKステッカーは調合液をよく攪拌させながら最後に加用する。 *KKステッカーに代えて、アピオンEの1000倍でもよい。	
対象病虫害：せん孔細菌病、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ ハマキムシ類、カメムシ類	
散布量：10a当り 600ℓ	

【注意事項】

- ①台風等で強風・降雨が予想される場合は、風雨前の予防散布を徹底する。
- ②4-12式ボルドー液に代えて、icボルドー412の30倍(水100ℓに3.3kg)を使用しても良い。
- ③コスカシバの発生園は、落葉後に(劇)ラビキラー乳剤200倍(休眠期・1回)を樹幹および主枝へていねいに散布する。

散布日	月	日
散布量		ℓ

ネクタリン

◎収穫終了後の散布（1回目のみダイアジノン水和剤34を混用する）

散布時期：9月上中旬～（収穫終了後）	
散布薬剤：	水 100ℓ
	icボルドー412 3.3kg
	(劇)ダイアジノン水和剤34（21日前、3回） 100g
	KKステッカー（固着性展着剤） 33ml
*KKステッカーは調合液をよく攪拌させながら最後に加用する。 *KKステッカーに代えて、アピオンEの1000倍でもよい。	
対象病虫害：せん孔細菌病、シンクイムシ類、ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ若齢幼虫	
散布量：10a当り 600ℓ	

【注意事項】

- ①台風等で強風・降雨が予想される場合は、風雨前の予防散布を徹底する。
- ②コスカシバの発生園は、落葉後にガットキラー乳剤100倍(休眠期・3回)又はトラサイドA乳剤200倍(収穫後～発芽前、3回)を樹幹および主枝へ、ていねいに散布する。

散布日	月	日
散布量		ℓ

裏面もご覧ください

1. 除袋について

*熟度の進み具合に注意し早めの着色管理を実施しましょう。

*曇雨天が続くと、成熟は早まる傾向があります。白根白桃の除袋は、間に合い次第実施してください。

品 種	除袋時期	除袋日 目安	
		南部	北部
選抜白根白桃	収穫 13～15 日前	間に合い次第 実施	間に合い次第 実施
ゴールデンピーチ	収穫 13～15 日前	9/4 頃までに	9/8 頃までに

2. 新梢管理について

樹冠内部や主枝・垂主枝の背面から発生した旺盛な徒長枝は、成葉 4～5 枚残して摘芯する。

樹勢が弱い樹は過度に摘芯するとさらに樹勢低下を招くので、できるだけ新梢は切らない。

3. 反射マルチの利用

反射マルチは、白色マルチ（タイベック・パールライト S）を活用しましょう！

★大部分の果実は下を向いています。樹下から太陽光線をあて着色向上を！！

白色マルチ「タイベック」「パールライト S」を使用すると、成熟の極端な進みを回避できます。

また、曇天が続く時期でも着色向上対策として有効ですので、積極的にご活用ください。

【使用時期】 ・着色のしやすい品種＝収穫 5～7 日前 ・着色しにくい品種＝収穫始めの 10～14 日前

4. 当面の管理

(1) 果実肥大が進んできており、枝折れが心配されます。支柱立ての見直しを行ないましょう。

(2) 秋季せん定

間伐・縮抜・太枝抜きの実施

秋季せん定は、樹体枯死の要因となる場合があるため、強せん定にならないよう注意する。

⇒ 切る枝量は、秋冬季せん定全体の 2 割以内に留める

(3) 収穫後の礼肥

● 天然ボカシ肥 5 袋 (7.5 kg) またはケイフン 7 袋 (10.5 kg)

(天然ボカシ肥成分：N-2.2 P-3.7 K-2.2 他) (発酵ケイフン成分：N-2.1 P-4.2 K-2.1 他)

(4) 9 月下旬：肥料の施用

「ニュー果じゅっこ」1～3 袋、または「もも有機 70」2～4 袋

農薬（毒物・劇物）をお買い求めの際は、印鑑をご持参ください。