

プラム・ブルーの特報No.10

令和1年9月2日
JA中野市営農センター
JA中野市プラム部会

台風10号及び秋雨などの被害に遭われた皆様には、お見舞い申し上げます。また、これから収穫を迎える品種についても選果、選別には十分注意して下さい。さて、防除について本年は、・黒斑病、かいよう病・シンクイムシ類の多発が問題となりました。今後の農薬散布も必ず実施し、病害虫の密度を減らしましょう。

1. 薬剤散布

《プラム》 晩生種 秋姫等

・散布時期：	9月上旬（9/4～9/8頃）	・散布日	9月	日
・散布薬剤：	水	100ℓ当り	・散布量	ℓ
展着剤（まくぴか）	20mℓ			
テッパン液剤	50mℓ	（前日、2回）		
オーシャインフロアブル	33mℓ	（前日、3回）		
・対象病害虫：	灰星病、シンクイムシ類、（ケムシ類）			
・散布量：	10a当り SS500ℓ 動噴 600ℓ	（散布むらのないよう十分に散布する）		
・注意事項	① 腐敗果、病虫害果は、園外へ除去しましょう。			
	② シンクイムシ類の発生が多い場合モスピラン顆粒水溶剤 4000 倍（前日、3 回）を加用散布する。			
	③ 収穫中の品種に散布した場合は、丸 1 日収穫を休むこと。			

スモモヒメシンクイムシ発生状況（ ）内、前週調査数

（各地区フェロモントラップ調査日：8/21） *上今井地区ー 8頭↓（43） *倭地区ー ↓89頭（100）
（前週フェロモントラップ調査日：8/14） *一本木ー 11頭↓（72） *草間ー ↓69頭（119）

《ブルー》 晩生種 等 特別散布

・散布時期：	9月上旬（9/4～9/8頃）	・散布日	9月	日
・散布薬剤：	水	100ℓ 当り	・散布量	ℓ
オーシャインフロアブル	33mℓ	（前日、3回）		
●モスピラン顆粒水溶剤	50g	（前日、3回）		
・対象病害虫：	灰星病、アブラムシ類、（シンクイムシ類）			
・散布量：	10a当り SS500ℓ 動噴 600ℓ	（散布むらのないよう十分に散布する。）		
・注意事項	① 腐敗果、病虫害果は、園外へ除去しましょう。			
	② 収穫中の品種に散布した場合は、丸 1 日収穫を休むこと。			

2. 収穫終了後、各品種の防除（受粉樹へも散布する）

※隣接園（特に収穫期の作物）に飛散しないように注意して下さい

・散布時期：	9月上旬～	・散布日	9・10月	日
・散布薬剤：	水	100ℓ 当り	・散布量	ℓ
展着剤	（注意事項②参照）			
ICボルドー412	3. 3kg			
●ダースバンDF	33g	（14日前、2回）		
・対象病害虫：	黒斑病（かいよう病）、シンクイムシ類、ウメシロカイガラムシ			
・散布量：	10a当り SS400ℓ 動噴 500ℓ	（各主枝、徒長枝等に十分かかるように散布する。）		
・注意事項	①汚れが多いので、周辺の作物へ飛散しないようにする。			
	②展着剤はアピオンーE1000 倍かK.Kステッカー3000 倍を使用する。尚、k kステッカーを使用する場合必ず最後に調合する。			
	③本年のボルドー散布は収穫後3～4回の防除を実施する。			

3. 礼肥の施肥（収穫終了後）・・・ 天然ボカシ肥 5袋（10a当り）