

もも・ネクタリン特報 ⑫



本年は市内広域でせん孔細菌病が発生し、果実被害が多い状況です。今後は台風襲来等による風雨で落葉と感染が同時に起こり、次年度への越冬菌が増加します。秋季ボルドー散布を実施し、越冬菌密度を減らすよう努めましょう。また、今後、収穫を迎える品種で灰星病の発生が見られる場合は、殺菌剤の特別散布を実施して下さい。

【せん孔細菌病対策 収穫後の薬剤散布】

収穫中の作物、隣接園への飛散（農薬汚れ）に注意

- ＊せん孔細菌病発生園は、ボルドー 3 回散布を徹底し、散布間隔は 1 4 日以内を厳守する。
- ＊台風襲来等の風雨が予想される前日までに散布を実施する。
- ＊薬剤が樹全体に到達するように、散布前に徒長枝切りを実施する。

散布時期 散布品種	第 1 回 ボルドー散布	第 2 回 ボルドー散布	第 3 回 ボルドー散布
・早生種～中生種 ・晩生種(川白、黄金桃など)	収穫終了後(9 月上旬～中旬)	第 1 回散布から 1 0 ～ 1 4 日後	第 2 回散布から 1 0 ～ 1 4 日後
・極晩生種(白根白桃など)	収穫終了後(9 月中下旬～)	第 1 回散布から 1 0 ～ 1 4 日後	第 2 回散布から 1 0 ～ 1 4 日後

もも

収穫終了後。下記のいずれかを選択して散布下さい。

ボルドー 体系

ムッシュボルドー 体系

散布時期：9 月上旬～（収穫終了後）

散布薬剤： 水 1 0 0 リットル
アビオン E（固着性展着剤） 1 0 0 ml
I C ボルドー 4 1 2 3 . 3 kg
スミチオン乳剤（3 日前、6 回） 1 0 0 ml

対象病虫害：せん孔細菌病、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ、ハマキムシ類、カメムシ類

散布量：1 0 a 当り 6 0 0 リットル

散布時期：9 月上旬～（収穫終了後）

散布薬剤： 水 1 0 0 リットル
アビオン E（固着性展着剤） 1 0 0 ml
スミチオン乳剤（3 日前、6 回） 1 0 0 ml
ムッシュボルドー DF 2 0 0 g

対象病虫害：せん孔細菌病、モモハモグリガ、ナシヒメシンクイ、ハマキムシ類、カメムシ類

散布量：1 0 a 当り 6 0 0 リットル

- ＊ムッシュボルドー DF に代えて、コサイド 3000 の 2000 倍を使用してもよい。
- ＊薬害の発生が心配される場合は、クレフノン 100 倍を加用する（ただし、汚れに注意）

＊スミチオン乳剤の加用は 1 回目のみとし、2 ～ 3 回目のボルドー散布時は加用しない。

【注意事項（共通）】

アビオン E に代えて、KK ステッカーの 3000 倍でもよい。

＊KK ステッカーは薬液をよく攪拌させながら必ず最後に加用する。

- ①台風等で強風・降雨が予想される場合は、風雨前の予防散布を徹底する。
- ②コスカシバの発生園は、落葉後に（劇）ラビキラー乳剤 200 倍（休眠期・1 回）を樹幹および主枝に十分に散布する。

散布日 月 日
散布量 リットル

次ページもご覧下さい

ネクタリン

収穫終了後。下記のいずれかを選択して散布下さい。

ボルドー 体系

ムッシュボルドー 体系

散布時期：9月上旬～（収穫終了後）

散布薬剤：水100ℓ

アビオンE（固着性展着剤）100ml

ICボルドー4123.3kg

劇ダイアジノン水和剤34（21日前、3回）100g

対象病害虫：せん孔細菌病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ若齢幼虫

散布量：10a当り600ℓ

散布時期：9月上旬～（収穫終了後）

散布薬剤：水100ℓ

アビオンE（固着性展着剤）100ml

ムッシュボルドーDF200g

劇ダイアジノン水和剤34100g

対象病害虫：せん孔細菌病、シンクイムシ類
ハマキムシ類、クワコナカイガラムシ若齢幼虫

散布量：10a当り600ℓ

*ムッシュボルドーDFに代えて、コサイド3000の2000倍を使用してもよい。

*薬害の発生が心配される場合は、クレフノン100倍を加用する（ただし、汚れに注意）

【注意事項】

アビオンEに代えて、KKステッカーの3000倍でもよい。

*KKステッカーは薬液をよく攪拌させながら必ず最後に加用する。

①台風等で強風・降雨が予想される場合は、風雨前の予防散布を徹底する。

②コスカシバの発生園は、フェニックスフロアブルの500倍（開花期まで・1回）を樹幹および主枝に十分散布する。

●8月中下旬からの降水量が多く、灰星病の発生が心配されます。下表を参考に殺菌剤の特別散布を実施して下さい。

	薬剤の系統	薬剤名	使用濃度	適正使用基準	使用上の注意事項
もも	エルゴステロール 生合成阻害剤（DMI）	スコア顆粒水和剤 オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 2000倍 2000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回）	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合があるので注意する。
	そ の 他	ベルコートフロアブル ダコニール1000	2000倍 1000倍	収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（6回）	
ネクタリン	エルゴステロール 生合成阻害剤（DMI）	スコア顆粒水和剤 オーシャインフロアブル オンリーワンフロアブル	2000倍 2000倍 2000倍	収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（3回） 収穫前日まで（3回）	1. ベルクートは、バラ・メロンに薬害を生じるのでかからないようにする。 2. ダコニール1000は、除袋直後に散布すると薬害が発生する場合があるので注意する。
	そ の 他	ベルコートフロアブル ダコニール1000	2000倍 1000倍	収穫前日まで（2回） 収穫前日まで（2回）	

毒物・劇物をご購入の際は、印鑑をご持参ください