

1. 摘葉補助剤の使用例

- 商品名：ジョンカラープロ
- 成分：キノキサリン系 12.5%、MEP 25.0%
- 登録内容：別紙 *1回のみ限定使用
- 販売包装単位：500g
- **販売価格：4,460 円／500g**
- 長野県内使用例

✦ 散布時期：9月末～10/6 *気温が高い日

✦ 使用薬剤

水 100 ℓ

ブラボー（専用展着剤） 200ml ～ 66ml

ジョンカラープロ（摘葉補助剤） 200g

✦ 散布量：500～600 ℓ／10a

✦ 対象：ふじ（限定）

2. 摘葉補助剤の使用注意点

- ① **最高気温 20℃以上の日が 2～3 日続く日の散布が最も効果的**である。また、晴天で温暖な薬液が乾きやすい時間帯に果そう葉を中心に散布する。
- ② 散布時間：気温が上昇し、葉が暖まっている日中の散布が効果的である。
- ③ 散布時期：収穫予定 30～50 日前 ⇒ 10 月第 1 週頃目安か
- ④ 散布後に降雨があった場合：薬液が乾いた状態であれば効果に問題はない。
- ⑤ **下枝付近及び柔らかい葉を中心に落葉し易い**。（散布後高温で推移した場合、約 7～10 日後に果そう葉を中心に黄変が始まり 10～14 日後に落葉する。）
- ⑥ 果実に薬液の汚れが残る場合があるので、専用展着剤ブラボーや機能性展着剤ササラを使用する。
- ⑦ **重複散布は行わない**。
- ⑧ 効果が不十分な場合は、追加散布を行わず、手摘み他で補正を行う。
- ⑨ 極端に早い時期に使用すると、過剰落葉の恐れがあり、果実肥大・蜜入り不良になるので適期に使用する。

3. 展着剤の使用について（価格は 2019 当用価格）

果実汚れ及び効果を十分に発揮するために、以下に展着剤のいずれかを使用する。

- ✦ **商品名：ブラボー（使用倍率：1,000～2,000 倍・価格：1,277 円／500ml）**
- ✦ **商品名：ササラ（使用倍率：2,000 倍・価格：1,223 円／500ml）**

使用例：ふじ限定

その①：ジョンカラー500 倍&ブラボー1,000 倍バージョン（最高倍率！）

✦ 使用薬剤

水	100 リットル	500 リットル
ブラボー（専用展着剤）	100ml	500ml（1 本）
ジョンカラープロ（摘葉補助剤）	200g	1000g（2 袋）

✦ 散布量：500～600 リットル／10a

その②：ジョンカラー500 倍&ブラボー2,000 倍バージョン（おすすめ！）

✦ 使用薬剤

水	100 リットル	500 リットル
ブラボー（専用展着剤）	50ml	250ml（半本）
ジョンカラープロ（摘葉補助剤）	200g	1000g（2 袋）

✦ 散布量：500～600 リットル／10a

その③：ジョンカラー1,000 倍&ブラボー1,000 倍バージョン（計量簡単！）

✦ 使用薬剤

水	100 リットル	500 リットル
ブラボー（専用展着剤）	100ml	500ml（1 本）
ジョンカラープロ（摘葉補助剤）	100g	500g（1 袋）

✦ 散布量：500～600 リットル／10a

その④：ジョンカラー500 倍&ササラ 2,000 倍バージョン

✦ 使用薬剤

水	100 リットル	500 リットル
ササラ（機能性展着剤）	50ml	250ml（半本）
ジョンカラープロ（摘葉補助剤）	200g	1000g（2 袋）

✦ 散布量：500～600 リットル／10a

その⑤：ジョンカラー500 倍&ニーズ 1,000 倍バージョン

✦ 使用薬剤

水	100 リットル	500 リットル
ニーズ（機能性着剤）	100ml	500ml（1 本）
ジョンカラープロ（摘葉補助剤）	200g	1000g（2 袋）

✦ 散布量：500～600 リットル／10a

(参考) 現地使用例 (ジョンカラープロ 500 倍 9/30 散布)

