

ジョンカラープロ散布調査

No	地区	散布日	倍率	ブラボー	ササラ	備考
1	草間	10月1日	1,200	○		下枝・日陰部分中心に落葉あり
2	赤岩	9月27日	1,000		○	下枝・日陰部分中心に落葉あり
3	柳沢①	9月29日	1,000	○		下枝・日陰部分中心に落葉あり
4	柳沢②	9月29日	500	○		500倍で全体に落葉あり
5	深沢	9月29日	1,200	○		下枝・日陰中心に部分的な効果

最高気温の推移

日付	最高気温(℃)	天気
9月27日	29.6	晴れ
9月28日	26.0	晴れ
9月29日	28.5	晴れ
9月30日	28.7	晴れ
10月1日	30.1	晴れ
10月2日	29.9	晴れ
10月3日	29.4	晴れ
10月4日	28.0	曇り 雨
10月5日	24.5	曇り 雨
10月6日	21.4	晴れ

草間 10/1 1200倍+ブラボー1200倍散布 調査日:10/8

散布後7日



赤岩 9/27 1000倍+ササラ5000倍

調査日:10/7

散布後10日



柳沢① 9/29 1000倍+ブラボー1000倍

調査日:10/8

散布後9日



柳沢② 9/29 500倍+ブラボー1000倍

調査日:10/8

散布後9日



深沢 9/29 1200倍+ブラボー1200倍

調査日:10/7

散布後8日



効果面(傾向)の検証と総括

- ① 下枝 > 上枝
- ② 日陰 > 日向
- ③ 弱小葉 > 大型葉
- ④ 基部葉 > 新梢葉
- ⑤ 500倍 > 1000倍 > 1200倍
- ⑥ ブラボー = ササラ
- ⑦ 徒長枝 効果なし(手散布でも効果なし)

総括 散布後の気温帯と密接な関係性あり。当面は1000～1200倍使用を基本に場合により500倍使用も考慮する。
展着剤は専用のブラボーを基本とするが、同類のササラ等の使用も可とする。
確実ではないが、葉摘み時間の省力化が図られる。よって、次年度以降も普及を拡大する。