

2020 年度 和梨【有袋版】病虫害防除暦

JA 中野市営農センター
JA 中野市ナシ部会

- ◆ 無袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。
- ◆ 有袋・無袋共通：キノンドー顆粒水和剤に代えて、キノンドーフロアブルでもよい。

散布日	散布時期	散布薬剤(水100ℓ当り)		収穫前 使用時期	使用 回数 (以内)	散布量 10a 当り (ℓ)	対象病虫害	注意事項
月 日	第 1 回 発芽前 3月下旬	(水 98ℓ) キノンドー顆粒水和剤 スプレーオイル	100g 2ℓ	3日前 発芽前	9回 —	300	黒斑病・輪紋病 カイガラムシ類	① 混用順：キノンドー顆粒水和剤にスプレー オイルを加用し、よく攪拌する。 ② キノンドー顆粒水和剤に代えて石灰硫黄合剤 10 倍(発芽前、—)でもよい。
月 日	第 2 回 発芽 7 日後 4月上中旬	(水 96.7ℓ) IC ボルドー48Q	3.3Kg	開花前	—	300	黒星病	① 散布が遅れた場合や散布直後に降雨があ ると薬害が生じることもあるので注意する。 ② 収穫中の作物への飛散に充分注意する。
日 月	第 3 回 開花期 4月下旬	展着剤 サムコルフロアブル 10 オルフィンフロアブル	20mℓ 20mℓ 25mℓ	前日 前日	3回 3回	350	黒斑病・黒星病 ハマキムシ類 ケムシ類	① 散布時期は、1～2 分咲を目安に散布する。
日 月	第 4 回 5月上旬 (前回10日後)	展着剤 スコア顆粒水和剤	20mℓ 33g	14日前	3回	350	黒斑病・黒星病	① アブラムシ類対策 ウララ DF2,000 倍(14 日前、2 回)を加用する。
月 日	第 5 回 5月中旬 (前回10日後)	展着剤 モスピラン顆粒水溶剤 ユニックス顆粒水和剤 47	20mℓ 25g 50g	前日 21日前	3回 3回	350	黒斑病・黒星病 アブラムシ類・カイガラムシ類 カメムシ類・シンクイムシ類	① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、 ビックマグ 1000 倍を加用する。
月 日	第 6 回 5月下旬 (前回10日後)	展着剤 トレノックスフロアブル コルト顆粒水和剤	20mℓ 200mℓ 25g	30日前 前日	5回 3回	350	黒斑病・黒星病 アブラムシ類 カイガラムシ類	① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、 ビックマグ 1000 倍を加用する。
月 日	第 7 回 6月上中旬 (前回15日後)	展着剤 ダーズバンDF アントラコール顆粒水和剤	20mℓ 33g 200g	30日前 45日前	3回 4回	400	黒斑病・黒星病 シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	① カイガラムシ類対策 アブロードフロアブル 1000 倍(30 日前、 2 回)を加用する。
月 日	第 8 回 6月下旬 (前回15日後)	展着剤 ベルコートフロアブル スプラサイド水和剤	20mℓ 50mℓ 66g	14日前 7日前	5回 3回	450	黒斑病・黒星病 シンクイムシ類 カイガラムシ類 カメムシ類	① 袋かけ前の防除とする。 ② 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のア ピオン E の 1000 倍を使用すると薬液付着 効果が高まる。
月 日	第 9 回 7月上中旬 (前回15日後)	展着剤 アーデントフロアブル ロブドー水和剤	20mℓ 50mℓ 125g	前日 14日前	3回 5回	450	黒斑病 シンクイムシ類 カメムシ類 ハダニ類	① ロブドー水和剤に代えて、キノンドー顆粒 水和剤 1000 倍(3 日前、9 回)でもよい。 ② 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のア ピオン E の 1000 倍を使用すると薬液付着 効果が高まる。
月 日	第 10 回 7月下旬 (前回15日後)	展着剤 ダニゲッターフロアブル キノンドー顆粒水和剤 オリオン水和剤40	20mℓ 50mℓ 100g 100g	前日 3日前 3日前	1回 9回 2回	450	黒斑病・輪紋病 ハダニ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類	① シンクイムシ類対策 オリオン水和剤に代えて、バリアード顆粒水和 剤 2000 倍(前日、3 回)を使用する。 ② 通常展着剤に代えてササラ 2000 倍を使用す ると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早 くなる効果がある。以降の回も同様。 ③ ダニゲッターフロアブルは開花期の水稻やシャ インマスカットに飛散しないように注意する。
月 日	第 11 回 8月上中旬 (前回15日後)	展着剤 コロマイト乳剤 ベルコートフロアブル イカズチ WDG	20mℓ 100mℓ 50mℓ 66g	前日 14日前 前日	1回 5回 3回	450	黒斑病・輪紋病 カメムシ類 シンクイムシ類 ハダニ類	① 幸水等の最終散布。 ② 早生種等ベルコートフロアブルに代えてキ ノンドー顆粒水和剤 1000 倍(3 日前、9 回) でもよい。
月 日	第 12 回 8月下旬 (前回15日後)	展着剤 エクシレル SE ナリアWDG	20mℓ 20mℓ 50g	前日 前日	3回 3回	450	黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類・ケムシ類	① 豊水等の最終散布。 ② ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュ に薬害を生じる恐れがあるので飛散しない ようにする。
月 日	第 13 回 9月上旬 (前回10日後)	展着剤 ダントツ水溶剤 ストロビードライフロアブル	20mℓ 50g 50g	前日 前日	3回 3回	450	黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 コナカイガラムシ類	① 南水・あきづき等の最終散布。 ② 通常展着剤に代えてササラ 2000 倍を使用す ると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早 くなる効果がある。

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル（D F）⇒顆粒水和剤（W D G）⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します。