

◆ 有袋栽培専用防除暦は裏面をご覧ください。

◆ 有袋・無袋共通：キノンドー顆粒水和剤に代えて、キノンドーフロアブルでもよい。

散布日	散布時期	散布薬剤(水100ℓ当り)	収穫前 使用時期	使用 回数 (以内)	散布量 10a当り (ℓ)	対象病害虫	注意事項
月 日	第1回 発芽直前 3月下旬	(水 98ℓ) キノンドー顆粒水和剤 100g スプレーオイル 2ℓ	3日前 発芽前	9回 —	300	黒斑病 輪紋病 カイガラムシ類	① 混用順：キノンドー顆粒水和剤にスプレー オイルを加用し、よく攪拌する。 ② キノンドー顆粒水和剤に代えて石灰硫黄合剤 10 倍(発芽前、—)でもよい。
日 月	第2回 発芽7日後 4月上中旬	(水 96.7 ℓ) IC ボルドー48Q 3.3kg	開花前	—	300	黒星病	① 散布が遅れた場合や散布直後に降雨がある と薬害が生じることもあるので注意する。 ② 収穫中の作物への飛散に充分注意する。
月 日	第3回 開花期 4月下旬	展着剤 20mℓ サムコフロアブル 10 20mℓ オルフィンフロアブル 25mℓ	前日 前日	3回 3回	350	黒斑病・黒星病 ハマキムシ類 ケムシ類	① 散布時期は、1～2分咲を目安に散布する。
月 日	第4回 5月上旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ スコア顆粒水和剤 33g	14日前	3回	350	黒斑病・黒星病	① アブラムシ類対策 ウララ DF2000 倍(14日前、2回)を加用する。
月 日	第5回 5月中旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ モスピラン顆粒水溶剤 25g ユニックス顆粒水和剤 47 50g	前日 21日前	3回 3回	350	黒斑病・黒星病 アブラムシ類・カイガラムシ類 カメムシ類・シンクイムシ類	① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、 ビクマグの 1000 倍を加用する。
月 日	第6回 5月下旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ トレノックスフロアブル 200mℓ コルト顆粒水和剤 25g	30日前 前日	5回 3回	350	黒斑病・黒星病 アブラムシ類 カイガラムシ類	① 葉色が薄い場合や黄化が見られる園は、 ビクマグの 1000 倍を加用する。
月 日	第7回 6月上中旬 (前回15日後)	展着剤 20mℓ ダズバンDF 33g アントラコール顆粒水和剤 200g	30日前 45日前	3回 4回	400	黒斑病・黒星病 シンクイムシ類、 ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ	① カイガラムシ類対策 アプロードフロアブル 1000 倍(30 日前、2 回) を加用する。
月 日	第8回 6月下旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ ベルコートフロアブル 50mℓ スプラサイド水和剤 66g	14日前 21日前	5回 2回	450	黒斑病・黒星病 シンクイムシ類、 カイガラムシ類 カメムシ類	① 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のア ピオン E の 1000 倍を使用すると薬液附着 効果が高まる。
月 日	第9回 7月上旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ アーデントフロアブル 50mℓ ロブドー水和剤 125g	前日 14日前	3回 5回	450	黒斑病 シンクイムシ類 カメムシ類 ハダニ類	① 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のア ピオン E の 1000 倍を使用すると薬液附着 効果が高まる。
日 月	第10回 7月中旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ ベルコートフロアブル 50mℓ	14日前	5回	450	黒斑病・輪紋病	① 通常展着剤に代えて、固着性展着剤のア ピオン E の 1000 倍を使用すると薬液附着 効果が高まる。
月 日	第11回 7月下旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ ダニゲッターフロアブル 50mℓ オリオン水和剤 40 100g キノンドー顆粒水和剤 100g	前日 3日前 3日前	1回 2回 9回	450	黒斑病・輪紋病 ハダニ類 シンクイムシ類 ハマキムシ類 カイガラムシ類	① 通常展着剤に代えてササラ 2000 倍を使用する と薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早く なる効果がある。以降の回も同様。 ② ダニゲッターフロアブルは開花期の水稲やシャ インマスカットに飛散しないように注意する。
月 日	第12回 8月上旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ コロマイト乳剤 100mℓ ベルコートフロアブル 50mℓ イカズチWDG 66g	前日 14日前 前日	1回 9回 3回	450	黒斑病・輪紋病 カメムシ類 シンクイムシ類 ハダニ類	① 幸水等の最終散布。 ② 早生種等ベルコートフロアブルに代えてキ ノンドー顆粒水和剤 1000 倍(3 日前、9 回) でもよい。
月 日	第13回 8月中旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ バリアード顆粒水和剤 50g	前日	3回	450	アブラムシ類 カメムシ類 シンクイムシ類	① 幸水等の最終散布。 ② 通常展着剤に代えてササラ 2000 倍を使用する と薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早く なる効果がある。
月 日	第14回 8月下旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ エクシレル SE 20mℓ ナリア WDG 50g	前日 前日	3回 3回	450	黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 ハマキムシ類・ケムシ類	① 幸水等の最終散布。 ② ナリア WDG は、ピオーネ、サニールージュ に薬害を生じる恐れがあるので飛散しない ようにする。
月 日	第15回 9月上旬 (前回10日後)	展着剤 20mℓ ダントツ水溶剤 50g ストロビードライフロアブル 50g	前日 前日	3回 3回	450	黒斑病・輪紋病 シンクイムシ類 カメムシ類 コナカイガラムシ類	① 南水・あきづき等の最終散布。 ② 通常展着剤に代えてササラ 2000 倍を使用する と薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早く なる効果がある。

◆ 安全・安心の農産物生産のために使用基準を厳守しましょう。

◆ 混用例：展着剤⇒液剤⇒乳剤⇒顆粒水溶剤⇒水溶剤⇒フロアブル⇒ドライフロアブル(DF)⇒顆粒水和剤(WDG)⇒水和剤

当防除暦の複製・コピーを禁止します。