



*定植からの日数は、定植する時期により異なるため生育期を目安に散布する。また、灰色かび病は梅雨期及び7月上旬に発生が見られるので、
変動的に散布に努める。

*オオタバコガ発生状況は、7月上旬、7月中旬、8月上旬、9月上旬のため例年多発する園地は事前の防除を心がける。

*アザミウマ類、ハダニ類、コナジラミ類は、発生初期から特別防除を行い、多発しないように努める。誘引粘着シートを設置し発生予察する。
「ピタットトルシー」捕獲用 10a 200 枚 (3mに1枚の目安)、予察用 10 枚

*混和順 水 → 展着剤 → 液剤 → 乳剤 → 水溶剤 → フロアブル剤 → 水和剤 ※事前によく溶かして使用しましょう

トルコギキョウ農薬使用基準

	薬剤名	薬剤系統	対象病虫害名	希釈倍率	使用回数
殺菌剤	オーソサイド水和剤 80	キャプタン系	立枯病、茎腐病、苗立枯病	600 倍	8 回以内
	リゾレックス水和剤	有機リン系 AH 殺菌剤	立枯病（リゾクトニア菌）、株腐病、白絹病	500 倍～1,000 倍	5 回以内
	ユニフォーム粒剤	アゾキシストロビン、メタラキシル	立枯病、(疫病)	18kg/10a	3 回以内
	ゲッター水和剤	N-フェニルカーバメート	灰色かび病	1,000 倍	5 回以内
	トップジン M 水和剤	MBC 殺菌剤	菌核病、(灰色かび病)、(うどんこ病)、(立枯病)	1,500 倍	5 回以内
	ポリオキシシ AL 水溶剤	ポリオキシシ剤	灰色かび病、うどんこ病、黒斑病、ハダニ類	2,500 倍	8 回以内
	フルピカフロアブル	メパニピリム	灰色かび病、(うどんこ病)	2,000 倍～3,000 倍	5 回以内
	アフエットフロアブル	SDHI	灰色かび病、(うどんこ病)、(さび病)	2,000 倍	3 回以内
	トレノックスフロアブル	チウラム(ジチオカーバメート系)	灰色かび病、(褐斑病、炭素病)	500 倍	6 回以内
	ダコニール 1000	TPN	(灰色かび病、茎腐病)	1,000 倍	6 回以内
殺虫剤	ロムダンフロアブル	I G R 系(脱皮促進剤)	シロイチモジヨトウ、ハスモンヨトウ	1,000 倍	5 回以内
	ノーモルト乳剤	I G R 系(キチン合成阻害)	ヨトウムシ類、(コナガ)、(ハスモンヨトウ)	2,000 倍	2 回以内
	オンコル粒剤 5	カーバメイト系	アザミウマ類(ミカンキイロ)、(コガネムシ類)	6kg/10a	3 回以内
	劇アドマイヤーフロアブル	ネオニコチノイド系	アブラムシ類、(アザミウマ類)	2,000 倍	5 回以内
	劇モスピラン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	アブラムシ類	4,000 倍	5 回以内
	アルバリン顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	アブラムシ類 コナジラミ類、(カメムシ類)	2,000 倍～3,000 倍	5 回以内
			ハモグリバエ類	1,000 倍	
	アクタラ顆粒水溶剤	ネオニコチノイド系	ミカンキイロアザミウマ	1,000 倍	6 回以内
			ハモグリバエ類、コナジラミ類	2,000 倍	
	アディオンフロアブル	ピレスロイド系	ヒラズハナアザミウマ、(ヨトウムシ類)	1,500 倍	6 回以内
	劇スカウトフロアブル	ピレスロイド系	アブラムシ類、アザミウマ類、(ヨトウムシ類)	2,000 倍～3,000 倍	5 回以内
	劇テルスターフロアブル	ピレスロイド系	ヒラズハナアザミウマ、(ハダニ類)、(カメムシ類)、(アブラムシ類)	4,000 倍	3 回以内
	トレボン乳剤	ピレスロイド系	ハスモンヨトウ、(チャノキイロアザミウマ)、(アブラムシ類)	1,000 倍	6 回以内
	ダニトロンフロアブル	METI 剤	ハダニ類	1,000 倍～2,000 倍	6 回以内
	アフアーム乳剤	マクロライド系	ハモグリバエ類・オオタバコガ・ヨトウムシ類、アザミウマ類	1,000 倍	5 回以内
	プレオフロアブル	ピリダリル	オオタバコガ、ハスモンヨトウ、(アザミウマ類)	1,000 倍	4 回以内
	劇コテツフロアブル	ピロール系 (呼吸阻害剤)	ヨトウムシ類・ミカンキイロアザミウマ、ハダニ類、(オオタバコガ)	2,000 倍	2 回以内
	オルトラン粒剤	有機リン系	アザミウマ類、アブラムシ類、ヨトウムシ類、アオムシ、(ネキリムシ類)	3～6kg/10a	合わせて 5 回以内
	オルトラン水和剤			1,000 倍	
	スミチオン乳剤	有機リン系	アザミウマ類、(アブラムシ類)、ハマキムシ類	1,000 倍	6 回以内
	コルト顆粒水和剤	ピルフルキナゾン	コナジラミ類、アブラムシ類、(チャノキイロアザミウマ)	4,000 倍	4 回以内
	ディアナ S C	スピノシン系	オオタバコガ、アザミウマ類、ハモグリバエ類、 (コナジラミ類)	2,500 倍～5,000 倍	2 回以内
	アクセルフロアブル	メタフルミゾン	オオタバコガ、(シロイチモジヨトウ)	1,000 倍	6 回以内

取り寄せ

取り寄せ

取り寄せ

取り寄せ

取り寄せ

取り寄せ