


除草剤使用時期及び有効草種葉枚数一覧表（2020年）


区分	除草剤名	使用適期	ノビエ	ホタルイ	ミズガヤツリ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	ヒルムシロ	藻類・(表層剥離)
初期	農将軍フロアブル	植代後～移植前7日	1.5	0.5	-	-	-	-	-	0
		移植直後～ $1.5$ 葉期								
初中期	プライオリティジャンボ	移植直後～ $3.5$ 葉期 ただし移植後30日まで	3.5	4.0	4.0	3.0	0.5	0.5	発生盛期	-
	アピログロウMX1 <sup>キロ</sup> 粒剤	移植直後～ $3.0$ 葉期 ただし移植後30日まで	3.0	3.0	3.0	2.0	0.5	0.5	発生期	0
	カウントダウンフロアブル	移植直後～ $3.5$ 葉期 ただし移植後30日まで	3.5	4.0	3.0 15cm	3.0	0.5	0.5	発生期	-
中後期	レプラスジャンボ	移植後14日～ $4.0$ 葉期まで (収穫60日前まで)	4.0	花茎 10cm	4.0	4.0	矢尻葉 3.0	草丈 30cm	生育期	-
	レプラス1 <sup>キロ</sup> 粒剤	移植後14日～ $4.0$ 葉期まで ただし、収穫60日前まで	4.0	花茎 10cm	4.0	4.0	矢尻葉 3.0	草丈 30cm	生育期	-
	ヒエクリーン1 <sup>キロ</sup> 粒剤	移植後15日～ $4.0$ 葉期 (収穫45日前まで)	4.0	-	-	-	-	-	-	-
後期	バサグラン粒剤	移植後15～55日 クログワイ対象 移植後15～35日	-	増殖中期			発生 揃期	草丈 15cm	-	-
	クリンチャーバスME液剤	移植後15日～ $5$ 葉期 (収穫50日前まで)	5.0	増殖中期			草丈 15cm	草丈 20cm	-	-
藻類	モゲトン粒剤	発生始～収穫45日前 (ウリカワ、ヒルムシロは3～4kg)	-	-	-	4.0	-	-	増殖期	発生盛期

下記の数え方を参考に除草剤を選択しましょう

葉の数え方 ノビエ



葉の数え方 ホタルイ



※ 数字について：効果が期待できる葉枚数の上限「0：発生前」、「0.5：発生始期」、又は草丈となっております。