



ぶどう特報

No.1 2020. 3. 30
J A 中野市営農センター
J A 中野市ぶどう部会

粗皮削り、藁はずしは一回目の防除前に行って下さい。(4月上旬頃)

ぶどう苗木植え付けは4月中旬頃に実施してください。(4/8講習会実施。別途通知)

発芽予想日	巨峰(昨年)	巨峰(今年)	シャイン(昨年)	シャイン(本年)
	4月28日	4月22日頃?	5月3日	4月27日頃?

休眠期特別散布【中梢・長梢園地・山際園地】

散布時期	4月上旬(ブドウトラカミキリ発生園…枝の髓が食害されているもの)		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	展着剤(ハイテンパワー)	20 ml	
	ラビキラー乳剤(劇物) (休眠期・2回以内)	500 ml	
散布量	300ℓ / 10a	適用病害虫	ブドウトラカミキリ
注意点	<ul style="list-style-type: none"> ラビキラー乳剤は訪花昆虫に影響があるので早朝散布を厳守する(4月上旬) 散布前に粗皮削りを実施し、主幹にしっかりかかるよう散布する。 ※晩腐病心配な方はベンレート水和剤200倍(休眠期、1回)を混用してもよい。 散布時は隣接するハウスや家屋などに飛散しないよう十分注意して実施する。 		

第1回ぶどう定期散布

散布時期	4月下旬頃(発芽直前(芽が膨らんだころ))	南部: 4/20~	北部: 4/23~
散布品種	全品種		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	アビオン-E(展着剤)	100 ml	
	パスポート顆粒水和剤 (休眠期・1回以内)	400 g	
散布量	300ℓ / 10a	適用病害虫	晩腐病・黒とう病
注意点	<ul style="list-style-type: none"> 他園地や隣接するハウスビニールへの飛散注意。(汚れ) りんご・もも等に薬剤がかかると薬害が発生するので注意する。 隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡してください。(ドリフト注意) ※黒とう病の発生が多いシャイン園は上記の防除に代えて下記の防除を実施してもよい。 		

【シャインマスカット黒とう病対策特別防除】

散布時期	4月中旬頃(発芽10日前頃)	南部: 4/17~	北部: 4/20~
散布品種	【第1回の防除に変えて散布】例年黒とう病の発生が多いシャインマスカット園地		
散布薬剤	水	100 ℓ	散布日 月 日
	アビオン-E(展着剤)	100 ml	
	石灰硫黄合剤 (発芽前)	10 ℓ	
散布量	200ℓ / 10a	適用病害虫	ハダニ類【黒とう病】
注意点	<ol style="list-style-type: none"> ①隣接する園地・ハウスへ絶対に飛散させない。(薬害・汚れ・錆) ②手散布の防除効果が高いため、できるだけ手散布で実施する。 ③りんご・もも等に薬剤がかかると薬害・落花が発生するので注意する。(ドリフト注意) ④晩腐病が心配な方は、ベンレート水和剤200倍(休眠期・1回)を加用散布する。 ⑤パスポート顆粒水和剤とは混用できないので注意する。 ⑥枝の病斑を園外に持ち出すなど、耕種的防除も併せて実施する。 		

次回特報配布は4月17日(金)です

◎2020年度 ぶどう防除暦採用農薬登録一覧表 (一印は規制なし ×印は登録なし)

農薬名	りんご	もも	なし	プラム	おうとう サクランボ	アスパラガス	きゅうり
ラビキラー乳剤	30日前	休眠期	×	×	休眠期	×	×
パースポート顆粒水和剤	45日前	前日	×	×	×	×	×
オンリーワンF	7日前	前日	前日	前日	前日	×	×
モスピラン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
ダイゾノ水和剤 34	30日前	前日	14日前	21日前	14日前	×	×
オーソサイド水和剤	前日	発芽前	3日前	21日前	3日前	×	前日
ドーシャスF	×	前日	×	×	×	×	前日
ストマイ液剤	×	60日前	×	×	×	×	×
フラスター液剤	×	×	×	×	×	×	×
パレード 15F	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
スプラサイド水和剤	30日	21日	21日・7日	14日	7日	×	×
コテツフロアブル	前日	前日	前日	前日	7日前	前日	前日
スイッチ顆粒水和剤	×	×	×	×	×	×	×
ゾマダケ水和剤	30日前	21日前	30日前	×	21日前	収穫終了後 秋期まで	前日
フェニックスフロアブル	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ゾーバックエニベル	×	×	×	×	×	×	前日
アドマイヤ-顆粒水和剤	3日前	3日前	3日前	21日前	×	前日	前日
ザンプロDMF	×	×	×	×	×	×	前日
アミスター10F	45日前	前日	前日	前日	前日	×	×
ディアナWDG	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ライメイフロアブル	×	×	×	×	×	×	前日
アーデントF	前日	前日	前日	前日	前日	×	×
ムツボルド-D F	×	開花前まで	×	葉芽発芽前 まで	収穫後	—	—
アルバリン顆粒水溶剤	前日	前日	前日	前日	前日	前日	前日
コロマイト水和剤	前日	×	前日	×	×	×	前日
ICボルドー66D	×	—	×	×	—	収穫終了後	×
テルスター水和剤	前日	14日前	前日	×	×	×	前日

※令和2年3月現在の状況です。

※農薬使用の際はラベルをよく読み、登録内容を確認してから使用・散布するようにして下さい。

毎年、薬剤飛散（ドリフト）による事故が発生しています。
畑に隣接している農作物には絶対飛散しない様にSS操作の確認をし、防除ネット等を設置し十分注意して下さい。

不明な点はお近くの事業所、または新営農センターまでお問い合わせ下さい。

薬剤散布をしたら栽培日誌に記入して下さい