

プラム・プルーン特報 No.3

令和2年3月30日
JA中野市営農センター
JA中野市プラム部会

3月下旬の気温も変動が激しいですが、以前平均気温は高めに経過し、生育は進んでおります。現状は、平年に比べ10日から2週間早めに推移し、地区間の開花状況は開いていると考えられます。
(予想として平岡で太陽の開花4月1日頃? - 平年4/14)

今後、落花期の防除は黒斑病・かいよう病対策として重要ですので、落花後の農薬散布が遅れないよう注意しましょう。
(受粉作業、凍霜害対策は万全に!!)

落花後の散布目安 (品種により差があります。園の状況を確認してください)

(南部 4/14 頃から? * 北部 4/17 頃から?)

薬剤散布 * 他作物にはかからないようにする。

プラム 散布時期: 落花後~4月中下旬 散布薬剤: 水 展着剤 オルフィンプラスフロアブル アグレプト水和剤	100%当り	100%当り
	10mℓ	
	33mℓ	(前日、3回)
	100g	(30日前、2回)
	・対象病害虫: 灰星病、黒斑病、(かいよう病) ・散布量: 10a当り SS400% 動噴500%	

・散布日	4月	日
・散布量		ℓ

①シンクイムシ類の発生が心配な場合はフェニックスフロアブル 4000 倍(前日、2回)を加用散布する。

②オルフィンプラスフロアブルに代えてオーシャインフロアブル 3,000 倍(前日、3回)でもよい

プルーン 散布時期: 落花後~4月下旬 散布薬剤: 水 展着剤 フルーツセイバー サムコルフロアブル 10	100%当り	100%当り
	10mℓ	
	66mℓ	(前日、3回)
	40mℓ	(3日前、3回)
	・対象病害虫: 灰星病、ケムシ類、シンクイムシ類 ・散布量: 10a当り SS400% 動噴500%	

・散布日	月	日
・散布量		ℓ

①スモモヒメシンクイ越冬世代成虫の発生があるため、散布の際は死角が生じないように注意する。