

ぶどう特報 No.2



No.2 2020.4.17
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

第一回目の防除実施時期です。発芽前に必ず散布しましょう。(4月20日～発芽前まで)

苗木の植え付け・藁外し・粗皮削り未実施の方は、早めに実施してください。

休眠期防除は週間天気予報や生育状況を確認して、散布遅れなく薬剤散布を実施して下さい。

発芽予想日	巨峰 (昨 年)	巨峰 (今 年)	シャイン (昨年)	シャイン (本年)
	4月28日	4月24日頃?	5月3日	4月29日頃?

第2回 シャインマスカット定期防除(カスミカメムシ対策防除(葉に穴をあける虫))

散布時期	発芽直後 (5月初旬頃)	南部: 4/28頃～	北部: 4/30頃～ (シャイン)	
散布品種	シャインマスカット、ロザリオビアンコ、単植・混植園【巨峰園などは特別散布】			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤 (ハイテンパワー)	10	ml	
	劇モスピラン顆粒水溶剤 (14日前・3回)	50	g	
散布量	300ℓ / 10a			
適用病害虫	ツマグロアオカスミカメ・カイガラムシ類・アザミウマ類			
注意点	<p>① <u>シャインマスカット、ロザリオビアンコ園は必ず散布する。(混植園も散布)</u></p> <p>② 訪花昆虫保護のため、畦畔の草刈りを実施し早朝に防除する。(散布時期に注意)</p> <p>③ 園地の3割程度が発芽したら散布を実施する。</p> <p>④ 例年被害が多い園は早めの散布を心がける。</p> <p>モスピランの散布時期 (園内3割が右の写真の頃) ⇒</p>			



第3回 シャインマスカット・クイーンルージュ定期防除(黒とう病対策防除)

散布時期	展葉 2~3枚 (5月上中旬頃)	南部: 5/6頃～	北部: 5/8頃～ (シャイン)	
散布品種	シャインマスカット、シャインマスカット混植園			
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤 (ハイテンパワー)	10	ml	
	オンリーワンフロアブル (前日・3回)	50	ml	
	劇ダイアジノン水和剤 34 (30日前・2回)	100	g	
散布量	300ℓ / 10a			
適用病害虫	黒とう病・うどんこ病・灰色かび病・晩腐病・(ツマグロアオカスミカメ)			
注意点	<p>※黒とう病重要防除。散布忘れ・遅れのないよう実施する。</p> <p>① べと病が心配な場合はワリーワンに代えてキントール顆粒水和剤 1,000倍 (45日前まで、4回 (開花後は1回)) を散布する。その際、ビニールや家屋への飛散に注意する (汚れ)</p> <p>オンリーワン散布時期 (園内3割が右の写真の頃) ⇒</p>			



次回特報は4月30日(木)頃 発行予定