



新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間講習会等の開催を自粛させていただきます。詳しくは各担当までお問い合わせください。

生育予想	巨峰（発芽）	巨峰（展葉6枚）	シャイン（発芽）	シャイン（展葉6枚）
	4月27日	5月15日頃？	5月1日	5月18日頃？

生育は低温が続いたため、生育は昨年並み（平年並み）となりました。シャインマスカット発芽直後のモスピラン顆粒水溶剤の散布遅れに注意してください。5月上旬は高温が予想されるため、かん水を実施してください。（特に苗木のかん水は細かく実施）

## 【コナカイガラムシ類・クビアカスカシバ対策特別防除】

塗布時期	コナカイガラムシ類：5月上旬頃      クビアカスカシバ：6月初旬頃			
塗布品種	コナカイガラムシ類の発生が多い園地・クビアカスカシバの発生が心配な園地			
塗布薬剤	水	40	ml	塗布日 月 日
	アルバリン顆粒水溶剤（幼果期まで、1回）	40	g	
塗布量	40g/1樹（塗布）			アルバリンとガットサイド併用方法 
適用病害虫	コナカイガラムシ類・クビアカスカシバ			
使用方法	①地上50cm～130cmの所を粗皮削りする。（50cm以上の幅を粗皮削りする） ②水とアルバリン顆粒水溶剤を1：1で希釈する。 ③泡立てるように幹にハケ等で塗り付ける。（流れやすい）			
注意点	①樹幹塗布は2回使用しないよう注意する。 ②ガットサイドSを併用する場合は右図のように使用する。 ③水ですぐ流れてしまうので、雨の日や畑かんの出る日の使用は避ける。（2～3日晴れる日を狙う）			

## 第4回ぶどう定期防除【今回から10日間隔で防除】

散布時期	展葉6枚頃（5月中旬）	南部：5/15～	北部：5/18～（巨峰）		
散布品種	全品種				
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml		
どれか 1剤 混用	オーソサイド水和剤 80	(30日前・2回)	125	g	※どれか1剤混用 こちらは葉面散布剤です。混用推奨。
	・ビッグマグ（種なし）	光合成向上	100	g	
	・グリーンデイズ（種なし）	光合成・花振り防止	100	g	
	・マルポロン（有核）	花振り防止	100	g	
	・オルガミンDA（種なし）	樹体健全化	100	ml	
散布量	300ℓ/10a				
適用病害虫	晩腐病・べと病・灰色かび病・黒とう病				
注意点	①カイガラムシ・カスミカメムシ・（クロヒメゾウムシ）発生園はコルト顆粒水和剤3,000倍（前日、3回）を加用する。				

次回特報は5月15日（金）頃 発行予定