

ぶどう特報



No.3 H27. 5. 8
JA中野市営農センター
JA中野市ぶどう部会

- ◆雨の降らない日が続いております。苗木を中心にたっぷりかん水を実施しましょう。
- ◆露地ぶどうの生育状況は有核巨峰で展葉 3~4 枚程度（ぶどうセンター周辺 5/6 現在）
- ◆今回の防除からベと病・晩腐病・灰色かび病の重要防除時期です。散布間隔 10 日を厳守厳守しましょう。

ぶどうセンター付近 露地巨峰	発 芽 期	展 葉 期	開 花 期	満 開 期	落 花 期
平 年	4月28日	5月2日	6月11日	6月14日	6月17日
昨 年	4月29日	5月2日	6月 6日	6月 9日	6月13日
本 年	4月28日	4月30日	6月6日頃?	6月9日頃?	6月13日頃?

【第2回ぶどう薬剤散布（有核・種なし共通）】

散布時期	展葉 6 枚頃（5／12～15 頃、もしくは前回から 1 0 日後）			
散 布 薬 剤	水	100ℓ	散布日	月 日
	展着剤	10ml		
	アリエッティ C 水和剤	125g（45 日前、2 回）	散布量	ℓ
	※【有核巨峰はマルポロン	100g（花振り防止）】		
	※【種なしはビックマグ	100g（葉の健全化）】		
	※は葉面散布剤です。天候不順対策として入れて下さい。			
散 布 量	1 0 アール当り 300ℓ 死角のないように散布			
適用病虫害	べと病・黒とう病・灰色かび病			
注 意 点	① <u>今回から 10 日間隔での薬剤散布を実施する。</u>			
	② <u>アリエッティ C 水和剤とオーソサイド水和剤 80 の一成分が同一のため、散布回数に注意する。</u> <u>（合計 2 回まで）</u>			
	③ シャインマスカットの若木または若樹勢樹等で薬害の心配な方はアリエッティ C 水和剤に代えて、 オーソサイド水和剤 80（45 日前まで、2 回）を散布してもよい。			
	④ カイガラムシ・アブラムシ・カスミカメムシの発生がある場合は、ダイアジノン水和剤 34 1,000 倍（収穫 30 日まで、2 回）を加用する。			
	⑤ 樹勢の弱い園地は、展葉 6 枚と 9 枚頃にアミノメリット特青 500 倍を散布する。			
	⑥ 農家在庫がある場合、アリエッティ C 水和剤に代えてキノンドー水和剤 80 1,200 倍（収穫 45 日前まで、4 回）を散布しても良い。ただしハウスビニールに汚れが生じるので注意。			

【第3回ぶどう薬剤散布（有核・種なし共通）】

散布時期		展葉 9 枚頃（5／21～24頃、もしくは前回から10日後）			
散 布 薬 剤	水	100ℓ	散布日	月	日
	展着剤	10ml			
	ドーシャスフロアブル	50ml（60日前、3回）	散布量		ℓ
	※【有核巨峰はマルポロン 100g（花振り防止）】				
※【種なしはビックマグ 100g（葉の健全化）】					
※は葉面散布剤です。天候不順対策として入れて下さい。					
散 布 量	10アール当り 300ℓ 死角のないように散布				
適用病虫害	晩腐病・べと病・黒とう病				
注 意 点	① アブラムシ等の害虫発生がある場合はアディオン水和剤 2,000 倍（7 日前まで、5 回）を散布する。 ② 日中の高温時の散布は避け、気温が低く、風のない時に散布をする。 ③ 葉の表裏にしっかりかかるよう散布する。				

※隣接園（特に収穫期の作物）に飛散しないように注意してください。

※防除の際、隣接地がアスパラガスの場合は事前に園主へ連絡してください。