

ぶどう特報 No. 4



No. 4 2020. 5. 15
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

生育は昨年並み（平年並み）で推移。種なしぶどうのストマイ液剤は散布遅れに注意してください
防除は予防を意識し、降雨が予想される日より前の散布を心がけましょう。

2020 年	発芽（前年比）	開花予想（前年比）	満開予想（前年比）
本 年（巨峰）	5 月 1 日（+4）	6 月 6 日頃（+0）	6 月 9 日頃（+0）
本年（シャイン）	5 月 3 日（+0）	6 月 10 日頃（+0）	6 月 14 日頃（+0）

第 5 回（第 3 回）ぶどう定期防除【前回から 10 日後】

散布時期	展葉 9 枚頃（5 月下旬頃）	南部：5/25 頃～	北部：5/27 頃～（巨峰）			
散布品種	全品種					
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日		
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml			
	ドーシャスフロアブル（60 日前・3 回）	50	ml			
	どれか 1 剤 混用	・ ビッグマグ（種なし）	光合成向上	100	g	こちらは葉面散布剤です。 混用推奨。
		・ グリーンデイズ（種なし）	光合成・花振り防止	100	g	
・ マルポロン（有核）		花振り防止	100	g		
・ オルガミン DA（種なし）		樹体健全化	100	ml		
散布量	300ℓ／10a					
適用病害虫	晩腐病・黒とう病・べと病					
注意点	① カイガラムシ類、（アブラムシ）等の害虫発生がある場合はトランスフォームフロアブル 1,000 倍（14 日前、3 回）を加用する。 ② 日中の高温時の散布は避け、気温が低く、風のない時に散布をする。 ③ 葉の表裏にしっかりかかるよう散布する。					

第 6 回【種なしぶどう必須散布】（ぶどうの種なし化）

散布時期	5 月下旬（満開の 14 日前～開花始期）				
散布品種	種なしぶどう全品種	巨峰：5 月 23 日頃～	シャイン：5 月 28 日頃～		
散布薬剤	水	100	ℓ	散布日 月 日	
	展着剤（ハイテンパワー）	10	ml		
	ストマイ液剤 20	(満開予定日の 14 日 前～開花始期)	100	ml	
散布量	300ℓ／10a				
注意点	※種なしぶどうは必ず散布する（有核巨峰には絶対にかからないよう注意する） ※満開 1 4 日前は概ね展葉 9 枚頃になるので、生育状況を確認して散布する。 ① 花穂に当るように、散布前に誘引を実施する。 ② 種なし巨峰とシャインマスカットの混植園は開花時期が違うのでストマイの散布時期に注意する。 ③ 散布が開花期に近いほど効果が低くなるので散布遅れに注意。				

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。

裏面ぶどう特報 No.5 あり