

ぶどう特報 No. 5



No.5 2020.5.15
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間講習会等の開催を自粛させていただきます。ご不明な点は各担当までお問い合わせください。

フラスター散布【全品種】（着粒安定・新梢伸長抑制）

散布時期	展葉 9 枚～11 枚頃 (5 月下旬～6 月上旬頃)	種なし：南部：6/1 頃～ 北部：6/3 頃～ 有核：南部：5/23 頃～ 北部：5/24 頃～			
散布品種	全品種				
散布薬剤	水		100	ℓ	散布日 月 日
	展着剤（ハイテンパワー）		10	ml	
	フラスター液剤	下記参照	50～200	ml	
	・有核巨峰		125～200	ml	5/25 頃～ 散布
	・種なし巨峰		100	ml	6/1 頃～ 散布
	・シャインマスカット		50	ml	6/10 頃～ 散布
	・カガハ・フル・ピオーネ等		125～200	ml	6/5 頃～ 散布
散布量	100～150ℓ／10a （手散布）		300ℓ／10a （露地巨峰）SS 散布		
注意点	※品種、散布方法により使用倍率、散布時期が違います。（登録厳守） ※有核巨峰は【ハイテンパワー】に代えて【アプローチBI 500 倍】を使用する ①日中の高温時は避けて散布する。				

第 7 回（第 4 回）【ぶどう定期防除】（黒とう病、晚腐病、スリップス類防除）

散布時期	前回から 10 日（開花 3 日前）			南部：6/3～ 北部：6/5～（巨峰）		
散布品種	全品種					
散布薬剤	水		100	ℓ	散布日 月 日	
	展着剤（ハイテンパワー）		10	ml		
	パレード 15 フロアブル	（7 日前、2 回）	50	ml		
	オーソサイド水和剤 80	（30 日前、3 回）	125	g		
	㊟スプラサイド水和剤	（14 日前、2 回）	66	g		
	どれか 1 剤 混用	・ ビッグマグ（種なし）	光合成向上	100	g	こちらは葉面散布剤 です。混用推奨。 ※どれか 1 剤混用
		・ グリーンデイズ（種なし）	光合成・花振り防止	100	g	
		・ マルポロン（有核）	花振り防止	100	g	
・ オルガミン DA(種なし)		樹体健全化	100	ml		
散布量	400ℓ／10a （※今回から 400ℓ※）					
注意点	① 灰色かび病の発生園はゲッター水和剤 1,500 倍（45 日前、1 回）を加用する。 ② シャインマスカット園で昨年ハダニの発生があった園は、カマイトフロアブル 1,000 倍（14 日前まで、1 回）を加用する。 ③ パレード 15 フロアブルに代えてフルツバハ 1,500 倍（7 日前、3 回）を使用してもよい					

どれか
1 剤
混用

※裏面ぶどう特報No.4 あり※ 次回特報は 6 月 2 日頃発行予定