

ぶどう特報No.7



No.7 2020.6.17
JA 中野市営農センター
JA 中野市ぶどう部会

- ・生育は平年並み程度。梅雨入り 6/11。防除やジベ処理は天気を確認しながら実施しましょう。
- ・防除は基本 10 日間隔で進め、連続した降雨が予想される際は 10 日を待たずに前倒しの散布を実施しましょう。

2020 年	開花	満開	落花
昨 年（巨峰）	6 月 5 日	6 月 9 日	6 月 13 日
本 年（巨峰）	6 月 5 日	6 月 9 日	6 月 12 日
本年（シャイン）	6 月 9 日	6 月 13 日	6 月 16 日

第 9 回【ぶどう定期防除】（黒とう病、晩腐病、スリップス類・クビアカスカシバ防除）

散布時期	前回から 10 日（落花 10 日後）		南部：6/23～ 北部：6/25～（巨峰）	
散布品種	全品種	対象病虫害	黒とう病、晩腐病、スリップス類、クビアカスカシバ	
散布薬剤	水		100	ℓ
	フェニックスフロアブル	（14 日前、2 回）	25	ml
	ゾーベックエニベル顆粒水和剤	（45 日前、2 回）	133	g
	●アドマイヤー顆粒水和剤	（21 日前、2 回）	10	g
散布量	400ℓ／10a			
注意点	※葉面散布剤は花粉溶脱の心配があるため、今回から袋掛け前までは加用しない。 ① 落花 10 日の防除は散布が遅いと薬液の汚れや果粉溶脱するので注意する。 ② ゾーベックエニベルに代えてペンコゼブフロアブル 1,000 倍（60 日前、2 回）を使用してもよい。但し、収穫前使用基準が 60 日前のため、8 月下旬出荷の品種は散布しない ② ジマンダ イソ・ゾーベックエニベル・ペンコゼブの一成分は同一成分のため使用回数に注意する（合計 2 回まで） ③ カメムシ・コガネムシ発生園はアドマイヤーに代えてアーデントフロアブル 2,000 倍（前日、4 回）を加用する。			

第 10 回【ぶどう定期防除】（晩腐病、黒とう病、スリップス類・ダニ類防除）

散布時期	前回から 10 日（落花 20 日後）		南部：7/3～ 北部：7/5～（巨峰）	
散布品種	全品種	対象病虫害	べと病、黒とう病、晩腐病、スリップス類	
散布薬剤	水		100	ℓ
	ザンプロDMフロアブル	（30 日前、2 回）	50	ml
	アミスター10フロアブル	（30 日前、3 回）	100	ml
	ディアナWDG	（前日、2 回）	10	g
散布量	400ℓ／10a			
注意点	① クビアカスカシバ等の主幹害虫発生園は、主幹、主枝へもたっぷり散布する。被害部にいる幼虫は捕殺またはスプレータイプの殺虫剤ロビンフット（収穫前日まで、5 回）を被害部に差し込み噴射する。 ② 汚れ、果粉溶脱が心配される場合は、ザンプロDMに代えてイトフインフロアブル 1,000 倍（7 日前、4 回）を散布する。 ③ 農薬散布の際は、隣接する園に注意し農薬飛散（ドリフト）のないよう十分注意する。			

ご不明な点はぶどう担当までご連絡下さい。

次回特報は 7 月 2 日頃発行予定