



ナン特報・和梨

令和2年7月17日
JA中野市営農センター
JA中野市ナン部会

No.6

毎日のお仕事お疲れ様です。本年の梅雨入りは、6/11（昨年 6/7）。梅雨入り後は、多雨・多湿が続いております。無袋栽培を行っている園地では、散布遅れのないように晴れ間を見て計画的に定期防除を進めてください。また、今後の管理として新梢（徒長枝）の整理を行い、園地に十分光が入るようにしてください。

◆ **和梨（有袋）** の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【有袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月20日前後	*左記は目安となります			◆ 散布日：7月 日
					◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水	100ℓ			
	展着剤	20ml			
	ダニゲッターフロアブル	50ml	(前日、1回)		
	キノンドー顆粒水和剤	100g	(3日前、9回)		
	劇オリオン水和剤40	100g	(3日前、2回)		
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類				
散布量	10a当り：450ℓ以上				
注意事項	① シンクイムシ類対策：オリオン水和剤40に代えて、劇バリアード顆粒水和剤2,000倍（前日、3回）を使用する。 ② 通常展着剤（ハイテンパワー等）に代えて、ササラ2,000倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。 ③ <u>ダニゲッターフロアブルは、開花期の水稻やシャインマスカットに飛散しないように注意する。</u> ④ オリオン水和剤40・バリアード顆粒水和は、劇物登録薬剤です。購入の際には印鑑を持参してください。				

【有袋】8月上旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	8月5日～10日	*左記は目安となります			◆ 散布日：8月 日
					◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水	100ℓ			
	展着剤	20ml			
	コロマイト乳剤	100ml	(前日、1回)		
	ベルコートフロアブル	50ml	(14日前、5回)	※注意事項②	
	イカズチWDG	66g	(前日、3回)		
対象病害虫	黒斑病、輪紋病、カメムシ、ハダニ類、シンクイムシ類				
散布量	10a当り：450ℓ以上				
注意事項	① 幸水等の最終散布。 ② 早生種等、収穫前規制に注意する ・ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。				

和梨（無袋）の薬剤散布は次ページをご覧ください

和梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】7月下旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月20日前後 ※左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 20ml ダニゲッターフロアブル 50ml（前日、1回） 劇オリオン水和剤 40 100g（3日前、2回） キノンドー顆粒水和剤 100g（3日前、9回）	◆ 散布量： ℓ
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、カメムシ類、クワコナカイガラムシ	
散布量	10アール当り：450ℓ以上	
注意事項	① 通常展着剤（ハイテンパワー）に代えて、ササラ2,000倍を使用すると薬液の広がりがよくなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。 ② <u>ダニゲッターフロアブルは、開花期の水稻やシャインマスカットに飛散しないように注意する。</u> ③ オリオン水和剤40は、劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【無袋】8月上旬の薬剤散布（前回から15日後）

散布時期	8月5日前後 *左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 20ml コロマイト乳剤 100ml（前日、1回） ベルコートフロアブル 50ml（14日前、9回） ※注意事項② 劇イカズチWDG 66g（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病虫害	黒斑病、輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① 幸水等の最終散布。 ② <u>早生種等、収穫前規制に注意する</u> ・ベルコートフロアブルに代えて、キノンドー顆粒水和剤1,000倍（3日前、9回）でもよい。 ④ イカズチWDGは劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。	

【無袋】8月中旬の防除（前回から10日後）

散布時期	8月15日前後 *左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 20ml 劇バリアード顆粒水和剤 50g（前日、3回）	◆ 散布量： ℓ
対象病虫害	アブラムシ類、カメムシ類、シンクイムシ類	
散布量	10アール当り：450ℓ	
注意事項	① 幸水等の最終散布 ② 通常展着剤に代えてササラ2,000倍を使用すると薬液の広がりが良くなり、散布後の乾きも早くなる効果がある。 ③ バリアード顆粒水和剤は劇物登録薬剤です。購入の際には印鑑を持参してください。	