



ナン特報・西洋梨 No.6

令和2年7月17日
J A 中野市営農センター
J A 中野市ナン部会

6/11 梅雨入り後は低日照・多雨・多湿が続いています。徒長枝などの整理を行い、園地内に十分光が入るようにしてください。また収穫まで一定の間隔で散布を進めてください。

◆ **西洋梨**の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【有袋】7月下旬の薬剤散布（前回より15日後）

散布時期	7月25日～30日 *左記は目安となります	◆ 散布日：7月 日	◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml ダニゲッターフロアブル 50ml (前日、1回) キノンドー顆粒水和剤 100g (3日前、9回) 劇オリオン水和剤 40 100g (3日前、2回)		
対象病害虫	輪紋病、ハダニ類、シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類		
散布量	10a 当り：600ℓ以上		
注意事項	① ダニゲッターフロアブルは開花期の水稻やシャインマスカットに飛散しないように注意する。 ② オリオン水和剤 40 は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。		

【有袋】8月中旬の薬剤散布（前回より20日後）

散布時期	8月15日～20日 *左記は目安となります	◆ 散布日：8月 日	◆ 散布量： リットル
散布薬剤	水 100ℓ 展着剤 10ml キノンドー顆粒水和剤 100ml (3日前、9回) 劇イカズチ WDG 66g (前日、3回)		
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、カメムシ類		
散布量	10a 当り：600ℓ以上		
注意事項	① オーロラ等の最終散布。 ② ハダニ類対策 ：コロマイト乳剤の1,000倍（前日、1回）を加用する。 ③ イカズチ WDG は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。		

◆ 7月中下旬の重点作業

① 土壌水分管理（土壌水分の激変を緩和）

梅雨明け後の急激な土壌乾燥防止 ⇒ 可樹冠下に敷きワラ等のマルチを早めに行ってください。

② 雑草管理：害虫の発生源となりますので、園内除草を徹底してください。

除草剤使用基準：バスタ液剤（水100ℓ 当り バスタ液剤500ml）

西洋梨（無袋）の薬剤散布は次頁をご覧ください

西洋梨（無袋）の薬剤散布（収穫前や収穫中の作物への飛散に十分注意してください。）

【無袋】7月中旬の薬剤散布（前回より10日後）

散布時期	7月20日前後			◆ 散布日：7月	日
散布薬剤	水	100ℓ		◆ 散布量：	ℓ
	展着剤	10ml			
	ベルコートフロアブル	50ml	(14日前、5回)		
対象病害虫	輪紋病				
散布量	10アール当たり：600ℓ以上				
注意事項	① ベルコートフロアブルは、ル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。				

【無袋】7月末の薬剤散布（前回から10日後）

散布時期	7月30日前後			◆ 散布日：7月	日
散布薬剤	水	100ℓ		◆ 散布量：	ℓ
	展着剤	10ml			
	ダニゲッターフロアブル	50ml	(前日、1回)		
	キノンドー顆粒水和剤	100g	(3日前、9回)		
	劇オリオン水和剤40	100g	(3日前、2回)		
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類、ハマキムシ類、ハダニ類				
散布量	10アール当たり：600ℓ				
注意事項	① ダニゲッターフロアブルは開花期の水稻やシャインマスカットに飛散しないように注意する。 ② オリオン水和剤40は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。				

【無袋】8月中旬の薬剤散布（前回から15日後）オーロラ最終防除

散布時期	8月15日前後			◆ 散布日：8月	日
散布薬剤	水	100ℓ		◆ 散布量：	ℓ
	展着剤	10ml			
	キノンドー顆粒水和剤	100ml	(14日前、5回)		
	劇バリアード顆粒水和剤	50g	(前日、3回)		
対象病害虫	輪紋病、シンクイムシ類				
散布量	10アール当たり：600ℓ				
注意事項	① ベルコートフロアブルはル・レクチェに薬害を生じるので使用しない。 ② バリアード顆粒水和は劇物登録薬剤です。購入の際は印鑑を持参してください。				

次回特報発行予定日：8月17日

8月末、9月中旬（最終）の薬剤散布について